

Экстремальные задачи:
полный конспект
(курс проф. В.Н.Малоземова,
321 – 324 и 341 – 345 группы,
2004/2005 учебный год)

Алексей Богатов, 345	Юрий Литвинов, 345
Александр Дольник, 341	Константин Щербаков, 345
Антон Комиссаров, 341	Георгий Чернышев, 342
Юрий Плотников, 341	Артем Кашин, 342

11 января 2005 г.

Содержание

0 Введение	3
1 Часть I. Линейные экстремальные задачи	6
1.1 Векторы и матрицы. Индексная техника	6
1.2 Постановка задачи линейного программирования (ЛП)	8
1.3 Теорема существования решения	11
1.4 Линейные неравенства	16
1.5 Критерий оптимальности	18
1.6 Теорема двойственности	21
1.7 Матричные игры	28
1.8 Принцип максимума для линейных дискретных систем	31
1.9 Симплекс-метод	34
1.10 Вычислительная схема симплекс-метода	39
2 Часть II. Нелинейные экстремальные задачи	42
2.1 Необходимые условия оптимальности в случае линейных ограничений	42
2.2 Критерий оптимальности для выпуклой целевой функции и линейных ограничений	45
2.3 Квадратичное программирование	52
2.4 Основная лемма нелинейного программирования	57
2.5 Теорема Куна-Таккера в дифференциальной форме	59
2.6 Достаточные условия строгого локального минимума	63
2.7 Необходимые условия оптимальности второго порядка	67
3 Часть III. Вариационные задачи	70
3.1 Квадратичные вариационные задачи. Критерий оптимальности	70
3.2 Критерий неотрицательной определенности квадратичной формы	75
3.3 Критерий положительной определенности интегральной квадратичной формы	80
3.4 Схема решения квадратичной вариационной задачи	82
3.5 Нелинейная вариационная задача. Уравнение Эйлера	84
3.6 Первый и второй дифференциалы интегрального функционала	85
3.7 Необходимые условия оптимальности	89
3.8 Достаточные условия строгого локального минимума	94
3.9 Параметрический метод построения главного решения уравнения Якоби	96
3.10 Задача о брахистохроне	99
3.11 Минимальная поверхность вращения	101
3.12 Изопериметрическая задача	103

Список иллюстраций

1.4.1 Двумерный случай	16
----------------------------------	----

0 Введение

$$f(x) \rightarrow \inf_{x \in P} \quad (0.0.1)$$

$$f(x) \rightarrow \sup_{x \in P} \quad (0.0.2)$$

P – множество планов, $x \in P$ – план, f – целевая функция

(0.0.1) Найти $x_1 \in P$: $f(x) \geq f(x_1) \quad \forall x \in P$

(0.0.2) Найти $x^* \in P$: $f(x) \leq f(x^*) \quad \forall x \in P$

x_1, x^* – оптимальные планы

(0.0.2) сводится к (0.0.1):

$$-f(x) \rightarrow \inf_{x \in P} \quad (0.0.3)$$

Множества оптимальных планов (0.0.2) и (0.0.3) совпадают, экстремальные значения различаются лишь знаком.

$$\alpha f(x) + \beta \rightarrow \inf_{x \in P}$$

при $\alpha > 0$ сводится к

$$f(x) \rightarrow \inf_{x \in P}$$

$$a > b \iff (a - b) > 0$$

Определение 0.0.1 Две экстремальные задачи

$$f(x) \rightarrow \inf_{x \in P}, \quad F(y) \rightarrow \inf_{y \in Q} \quad (0.0.4)$$

наз. эквивалентными, если

$$\forall x \in P \quad \exists y \in Q \quad f(x) \geq F(y), \quad \forall y \in Q \quad \exists x \in P \quad F(y) \geq f(x).$$

Лемма 0.0.1 Задачи (0.0.4) эквивалентны \Rightarrow

$$\overbrace{\inf_{x \in P} f(x)}^{=\mu} = \overbrace{\inf_{y \in Q} F(y)}^{=\nu}; \quad (0.0.5)$$

при этом обе задачи одновременно имеют или не имеют решение.

Доказательство.

$$\forall x \in P \quad \exists y \in Q \quad f(x) \geq F(y) \geq \nu \quad \Rightarrow \quad \mu \geq \nu$$

Аналогично $\nu \geq \mu$.

Пусть x^* – оптимальный план, т.е. $f(x^*) = \mu$.

$$\exists y^* \in Q \quad f(x^*) \geq F(y^*)$$

$$\text{Но } F(y^*) \geq \nu = \mu \quad \Rightarrow \quad F(y^*) = \nu \quad \Rightarrow \quad y^* \text{ – оптимальный план.}$$

Что и требовалось доказать.

Пример 0.0.1

$$\varphi(x) := \max_{i \in 1:n} f_i(x) \rightarrow \inf_{x \in P} \quad (0.0.6)$$

$$\psi(x, t) := t \rightarrow \inf, \quad (0.0.7)$$

$$f_i(x) \leq t, \quad i \in 1:n, \quad x \in P$$

Доказательство эквивалентности (0.0.6) и (0.0.7).

$$x_0 \in P; \quad t_0 := \max_{i \in 1:n} f_i(x_0)$$

(x_0, t_0) – план (0.0.7)

$$\psi(x_0, t_0) = t_0 = \max f_i(x_0) = \varphi(x_0)$$

(x_0, t_0) – план (0.0.7) $\Rightarrow x_0 \in P$ – план (0.0.6)

$$\varphi(x_0) = \max_{i \in 1:n} f_i(x_0) \leq t_0 = \psi(x_0, t_0)$$

(x_*, t_*) – оптимальный план (0.0.7) $\Rightarrow t_* = \max_{i \in 1:n} f_i(x_*)$

Что и требовалось доказать.

Пример 0.0.2

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^m |f_i(x)| \rightarrow \inf_{x \in P} \quad (0.0.8)$$

$$\psi(x, u, v) = \sum_{i=1}^m (u_i + v_i) \rightarrow \inf_{x \in P}, \quad (0.0.9)$$

$$f_i(x) = u_i - v_i, \quad u_i \geq 0, \quad v_i \geq 0, \quad i \in 1:n$$

Доказательство эквивалентности (0.0.8) и (0.0.9).

$$a \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists u, v \geq 0 : a = u - v, \quad |a| = u + v$$

$$u = \frac{|a| + a}{2} \geq 0, \quad v = \frac{|a| - a}{2} \geq 0$$

$x \in P$ – план (0.0.8)

$$a_i = f_i(x) = u_i - v_i, \quad |a_i| = u_i + v_i, \quad u_i, v_i \geq 0$$

(x, u, v) – план (0.0.9)

$$\psi(x, u, v) = \sum_{i=1}^m (u_i + v_i) = \sum_{i=1}^m |f_i(x)| = \varphi(x)$$

(x, u, v) – план (0.0.9) $\Rightarrow x \in P$ – план (0.0.8)

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^m |f_i(x)| = \sum_{i=1}^m |u_i - v_i| \leq \sum_{i=1}^m (|u_i| + |v_i|) = \sum_{i=1}^m (u_i + v_i) = \psi(x, u, v)$$

Что и требовалось доказать.

Задачи

1 Задача Ферма

Вырезать квадратные уголки квадратного листа так, чтобы получилась коробка наибольшего объема.

2* Задача Кеплера

В шар вписать цилиндр наибольшего объема.

3 Задача о шатре

Найти прямой круговой конус наибольшего объема при заданной площади боковой поверхности.

4*

$$\varphi(x) := \sum_{i=1}^m [f_i(x)]_+ \rightarrow \inf_{x \in P}$$

Построить эквивалентную экстремальную задачу с линейными ограничениями.

5*

$$-x \rightarrow \inf, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$-(u+v) \rightarrow \inf, \quad x = u - v, \quad u, v \geq 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

Доказать, что задачи не эквивалентны.

6

$$P = \bigcup_{i=1}^k P_i$$

Доказать, что

$$\inf_{x \in P} f(x) = \inf_{i \in 1:k} \inf_{x \in P_i} f(x)$$

1 Часть I. Линейные экстремальные задачи

1.1 Векторы и матрицы. Индексная техника

M, N — конечные индексные множества.

\mathbb{R}^N — линейное пространство векторов.

$x = x[N]$ с компонентами $x[j], j \in N$

$N = 1 : n \Rightarrow \mathbb{R}^N = \mathbb{R}^n$

$\mathbb{O} = \mathbb{O}[N]$ — нулевой вектор. $e_i = e_i[N], i \in N$ — i -й орт. ($e_i[i] = 1, e_i[k] = 0$ при $k \neq i$)

$\langle c, x \rangle = c[N] \times x[N] = \sum_{j \in N} c[j] \times x[j]$ — скалярное произведение c и x .

$A = A[M, N]$ — матрица с элементами $A[i, j], i \in M, j \in N$

$A^T = A^T[N, M]$ — транспонированная матрица с элементами $A^T[j, i] = A[i, j], i \in M, j \in N$

$A[M_1, N_1], M_1 \subset M, N_1 \subset N$ — подматрицы.

$A[M, j]$ — j -й столбец A , $A[i, N]$ — i -я строка A .

$E[N, N]$ — единичная матрица ($E[i, i] = 1, E[i, k] = 0, i \neq k$)

$y = Ax = A[M, N] \times x[N]$ — вектор с координатами $y[i] = A[i, N] \times x[N], i \in M$

$v = uA = u[M] \times A[M, N]$ — вектор с координатами $v[j] = u[M] \times A[M, j], j \in N$

$x[N] \geq \mathbb{O}[N] \Leftrightarrow x[j] \geq 0 \quad \forall j \in N$

Свойства:

1.

$$N_1 \subset N, N_2 = N \setminus N_1$$

$$c[N] \times x[N] = c[N_1] \times x[N_1] + c[N_2] \times x[N_2]$$

$$\left(\sum_{j \in N} = \sum_{j \in N_1} + \sum_{j \in N_2} \right)$$

2.

$$N_1 \subset N, N_2 = N \setminus N_1$$

$$A[M, N] \times x[N] = A[M, N_1] \times x[N_1] + A[M, N_2] \times x[N_2]$$

$$M_1 \subset M, M_2 = M \setminus M_1$$

$$u[M] \times A[M, N] = u[M_1] \times A[M_1, N] + u[M_2] \times A[M_2, N]$$

Доказательство.

$$A[i, N] \times x[N] = \underbrace{A[i, N_1] \times x[N_1]}_{i\text{-я компонента } 1 \text{ вектора}} + \underbrace{A[i, N_2] \times x[N_2]}_{i\text{-я компонента } 2 \text{ вектора}}$$

Что и требовалось доказать.

Следствие 1.1.1

$$Ax = \sum_{j \in N} A[M, j] \times x[j]$$

$$uA = \sum_{i \in M} u[i] \times A[i, N]$$

3.

$$N_1 \subset N, \quad E[N_1, N] \times x[N] = x[N_1]$$

$$x[N] \times E[N, N_1] = x[N_1]$$

Доказательство.

$$E[N_1, N] \times x[N] = E[N_1, N_1] \times x[N_1] + \underbrace{E[N_1, N_2]}_{\oplus[N_1, N_2]} \times x[N_2] = E[N_1, N_1] \times x[N_1] = x[N_1]$$

$$N_2 = N \setminus N_1$$

Что и требовалось доказать.

4.

$$u[M] \times (A[M, N] \times x[N]) = (u[M] \times A[M, N]) \times x[N]$$

Доказать самостоятельно.

$$\langle u, Ax \rangle = \langle uA, x \rangle$$

$$\langle u, Ax \rangle = \langle A^T u, x \rangle$$

$$u[M] \times A[M, N] = A^T[N, M] \times u[M]$$

Задачи

7 Доказать, что

$$A[M, P] \times B[P, N] = \sum_{k \in P} A[M, k] \times B[k, N]$$

8* $A[M, N]$ — матрица с линейно независимыми столбцами.

$$M_0 \subset M : \forall i \in M \setminus M_0 \quad \exists u_i$$

$$A[i, N] = u_i[M_0] \times A[M_0, N]$$

Доказать, что $A[M_0, N]$ линейно независимы.

1.2 Постановка задачи линейного программирования (ЛП)

$$f(x) := c[N] \times x[N] \rightarrow \inf \quad (1.2.1)$$

$$A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1]$$

$$A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2]$$

$x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1]$ — знаковое ограничение.

$$N_1 \subset N, \quad M_1 \cap M_2 = \emptyset, \quad N_2 = N \setminus N_1, \quad M = M_1 \cup M_2$$

$$A[M, N]$$

Ω —множество планов.

$$\langle c, x \rangle \rightarrow \inf_{x \in \Omega}$$

Л. В. Канторович (1912 – 1986) — задача планирования производства (станки - детали - изделия).

m станков, n деталей. $p_1 : p_2 : \dots : p_n$ — пропорции деталей для одного изделия.

a_{ik} : количество деталей k -го вида, которые производит i -й станок за день.

x_{ik} : часть дня, которую i -й станок тратит на изготовление деталей k -го вида. $\sum_{i=1}^m a_{ik} x_{ik}$ — количество деталей k -го вида, которые производят все станки за день.

$$\sum_{k=1}^n x_{ik} = 1, \quad i \in 1 : m$$

$$x_{ik} \geq 0, \quad i \in 1 : m, \quad k \in 1 : n$$

$$\underbrace{\min_{k \in 1:n} \frac{\sum_{i=1}^m a_{ik} x_{ik}}{p_k}}_t \rightarrow \sup$$

$$t \rightarrow \sup$$

$$\frac{\sum_{i=1}^m a_{ik} x_{ik}}{p_k} \geq t, \quad k \in 1 : n$$

$$\sum_{k=1}^m x_{ik} = 1, \quad x_{ik} \geq 0, \quad i \in 1 : m, \quad k \in 1 : n.$$

План дальнейшей деятельности:

1. Существование решений.
2. Критерий оптимальности.
3. Единственность решения.
4. Описание всего множества решений.
5. Численный метод.

$$\begin{aligned}
f(x) &:= \sum_{j \in N} c[j] \times x[j] \\
\sum_{j \in N} A[i, j] \times x[j] &\geq b[i], \quad i \in M_1 \\
\sum_{j \in N} A[i, j] \times x[j] &= b[i], \quad i \in M_2 \\
x[j] &\geq 0, \quad j \in N_1
\end{aligned}$$

Задача вида

$$\begin{aligned}
f(x) &= c[N] \times x[N] \rightarrow \inf \tag{1.2.2} \\
A[M, N] \times x[N] &= b[M] \\
x[N] &\geq \mathbb{O}[N]
\end{aligned}$$

называется *канонической задачей линейного программирования*

$$\begin{aligned}
f(x) &= \langle c, x \rangle \rightarrow \min \\
Ax &= b \\
x &\geq \mathbb{O}
\end{aligned}$$

Среди неотрицательных решений найти решение, минимизирующее целевую функцию. Всякая задача в общей форме выражается через задачу в канонической форме.

Ω – множество планов (1.2.1).

$$\begin{aligned}
N_2 &= N \setminus N_1 \\
x_0[N_2] &= \underbrace{y_0[N_2]}_{\geq 0} - \underbrace{z_0[N_2]}_{\geq 0} \\
w_0[M_1] &= A[M_1, N] \times x_0[N] - b[M_1] \\
A[M_1, N_1] \times x_0[N_1] + A[M_1, N_2] \times y_0[N_2] - A[M_1, N_2] \times z_0[N_2] - w_0[M_1] &= b[M_1] \\
A[M_2, N_1] \times x_0[N_1] + A[M_2, N_2] \times y_0[N_2] - A[M_2, N_2] \times z_0[N_2] &= b[M_2] \\
v_0 &= (x_0[N_1], y_0[N_2], z_0[N_2], w_0[M_1]) \\
A_0 &= \begin{pmatrix} A[M_1, N_1] & A[M_1, N_2] & -A[M_1, N_2] & -E[M_1, M_1] \\ A[M_2, N_1] & A[M_2, N_2] & -A[M_2, N_2] & \mathbb{O}[M_2, M_1] \end{pmatrix} \\
A_0 &= (A[M, N_1], A[M, N_2], -A[M, N_2], -E[M, M_1]) \\
\langle c, x_0 \rangle &= c[N_1] \times x_0[N_1] + c[N_2] \times y_0[N_2] - c[N_2] \times z_0[N_2] \\
c_0 &= (c[N_1], c[N_2], -c[N_2], \mathbb{O}[M_1]) \\
\langle c, x_0 \rangle &= \langle c_0, v_0 \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle c_0, v \rangle &\rightarrow \inf \tag{1.2.3} \\
A_0 v &= b, \quad v \geq \mathbb{O}
\end{aligned}$$

Теорема 1.2.1 (1.2.1) и (1.2.3) эквивалентны.

Доказательство.

$x_0 \in \Omega \Rightarrow$ строим v_0 — план (1.2.3).

$\langle c_0, v_0 \rangle = \langle c, x_0 \rangle$ — значения целевой функции равны.

$v_0 = (x_0[M_1], y_0[N_2], z_0[N_2], w_0[M_1])$ — план (1.2.3).

$\Rightarrow x_0 = (x_0[M_1], y_0[N_2] - z_0[N_2])$

Очевидно, что $x_0 \in \Omega$ и $\langle c, x_0 \rangle = \langle c_0, v_0 \rangle$

Что и требовалось доказать.

Задачи

9* Решить задачу ЛП

$$v \rightarrow \inf$$

$$u[k] - v = a[k], \quad k \in 1 : n$$

$$v \geq 0; \quad u[k] \geq 0$$

где $a[k]$ — заданные числа.

1.3 Теорема существования решения

$$f(x) := c[N] \times x[N] \rightarrow \inf \quad (1.3.1)$$

$$\Omega : \begin{cases} A[M, N] \times x[N] = b[M] \\ x[N] \geq \mathbb{O}[N] \end{cases}$$

Если Ω ограничено, то решение существует по теор. Вейерштрасса.

$$x \in \Omega : \quad N_+(x) = \{j \in N | x[j] > 0\}$$

Определение 1.3.1 План $x \in \Omega$ называется **базисным**, если $A_j = A[M, j], j \in N_+(x)$, линейно независимы. (столбцы A , соответствующие носителю плана x , линейно независимы). Нулевой вектор, если он является планом, будет по определению базисным.

x — базисный план. $x \neq \mathbb{O}$, $N_+ = N_+(x)$

$$\sum_{j \in N_+} x[j]A_j = b \quad (Ax = b)$$

$$x[j] > 0, j \in N_+, \quad x[j] = 0, j \in N \setminus N_+$$

Система $\sum_{j \in N_+} z[j]A_j = \mathbb{O}$ имеет только нулевое решение.

$$A[M, N_+] \times z[N_+] = \mathbb{O}[M] \quad (1.3.2)$$

Теорема 1.3.1 (о существовании решения).

Если $\Omega \neq \emptyset$ и $\inf_{x \in \Omega} f(x) > -\infty$, то существует оптимальный базисный план.

Лемма 1.3.1 Пусть выполнено условие теоремы и $b \neq \mathbb{O}$. Тогда по любому плану $x_0 \in \Omega$ можно построить базисный план $y_0 : \langle c, x_0 \rangle \geq \langle c, y_0 \rangle$.

Доказательство.

Возьмем $x_0 \in \Omega$. Поскольку $b \neq \mathbb{O}$, то $N_+ := N_+(x_0) \neq \emptyset$

Рассмотрим систему (1.3.2). Если она имеет только нулевое решение, то x_0 — базисный план. ($y_0 := x_0$)

Пусть (1.3.2) имеет ненулевое решение $z_0[N_+]$. Дополним $z_0[N \setminus N_+] = \mathbb{O}[N \setminus N_+]$

$$Az_0 = \mathbb{O}, \quad z_0 \neq \mathbb{O} \quad (1.3.3)$$

1. $\langle c, z_0 \rangle = 0$. Можно считать, что у z_0 есть хотя бы одна положительная компонента (иначе z_0 заменить на $-z_0$)

$$x(t) := x_0 - tz_0, \quad t > 0$$

$$\begin{aligned} Ax(t) &= b = \quad \forall t > 0 \\ &= Ax_0 - t \underbrace{Az_0}_{=\mathbb{O}} \end{aligned}$$

$$x(t) \geq \mathbb{O} \quad ?$$

(a)

$$j \in N \setminus N_+ : \quad x(t)[j] = 0 \quad \forall t$$

(b)

$$j \in N_+, z_0[j] \leq 0 : \quad x_0[j] - tz_0[j] > 0 \quad \forall t > 0$$

(c)

$$j \in N_+, z_0[j] > 0 : \quad x_0[j] - tz_0[j] \geq 0 \iff t \leq \frac{x_0[j]}{z_0[j]}$$

$$t_0 := \min \left\{ \frac{x_0[j]}{z_0[j]} \mid j \in N_+, z_0[j] > 0 \right\} \quad (1.3.4)$$

j_0 – индекс, на котором достигается минимум

$$x_1 = x(t_0) = x_0 - t_0 z_0 \in \Omega,$$

$$N_+(x_1) \not\subseteq N_+(x_0) \text{ (выбираем индекс } j_0)$$

$$\langle c, x_1 \rangle = \langle c, x_0 \rangle - t_0 \overbrace{\langle c, z_0 \rangle}^{=0} = \langle c, x_0 \rangle$$

2.

$$\langle c, z_0 \rangle \neq 0.$$

Можно считать, что $\langle c, z_0 \rangle > 0$, иначе вместо z_0 возьмем $-z_0$.

Докажем, что $\exists j \mid Z_0[j] > 0$.

От противного: пусть $z_0 \leq \mathbb{O}$.

$$x(t) := x - tz_0; \quad x(t) \in \Omega \quad \forall t > 0 \quad (Ax(t) = b, x(t) \geq \mathbb{O} \quad \forall t > 0)$$

$$\langle c, x(t) \rangle = \langle c, x_0 \rangle - t \overbrace{\langle c, z_0 \rangle}^{>0} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} -\infty$$

Противоречие условию $\inf f(x) > -\infty$.

t_0 – по формуле (1.3.4); $x_1 = x_0 - t_0 z_0 \in \Omega, N_+(x_1) \not\subseteq N_+(x_0)$.

$$\langle c, x_1 \rangle = \langle c, x_0 \rangle - t_0 \overbrace{\langle c, z_0 \rangle}^{>0} < \langle c, x_0 \rangle$$

Итак, если x_0 не является базисным планом, то $\exists x_1 \in \Omega : N_+(x_1) \not\subseteq N_+(x_0), \langle c, x_1 \rangle \leq \langle c, x_0 \rangle$.

x_1 – либо базисный план, либо нет; во втором случае $\exists z_1 : Az_1 = \mathbb{O}, z_1 \neq \mathbb{O}$.

Тогда перейдем от x_1 к x_2 , как выше от x_0 к x_1 :

$$N_+(x_2) \not\subseteq N_+(x_1), \quad \langle c, x_2 \rangle \leq \langle c, x_1 \rangle$$

За конечное число шагов дойдем до базисного плана y_0 .

Что и требовалось доказать.

Доказательство (теоремы о существовании решения).

1.

$$b = \mathbb{O} \Rightarrow \langle c, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \Omega$$

(пусть $\exists x_0 : \langle c, x_0 \rangle < 0$, тогда

$$x(t) = tx_0 \in \Omega \quad \forall t > 0, \text{ поскольку } Ax(t) = \mathbb{O}, x(t) \geq \mathbb{O};$$

$$\langle c, tx_0 \rangle = t \langle c, x_0 \rangle \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} -\infty$$

Итак, в этом случае $x_* = 0$ – оптимальный БП.

2.

$$b \neq \mathbb{O} :$$

Поскольку $\Omega \neq \emptyset$, существует БП y_0 .

Покажем, что базисных планов конечное число.

Проверим, что разные БП имеют разные носители.

От противного. Пусть $y_0 \neq y_1$ – БП, $N_+(y_0) = N_+(y_1) =: N_+$, $y_0[N_+] \neq y_1[N_+]$.

$$\sum_{j \in N_+} y_0[j]A_j = b, \quad \sum_{j \in N_+} y_1[j]A_j = b \Rightarrow \sum_{j \in N_+} (y_0[j] - y_1[j])A_j = \mathbb{O},$$

что противоречит базисности планов y_0 и y_1 .

Итак, базисных планов конечное число. y_1, \dots, y_k – БП.

Выберем $x_* \in \{y_1, \dots, y_k\} : \langle c, x_* \rangle = \min_{j \in 0:k} \langle c, y_j \rangle$.

Покажем, что x_* – оптимальный БП для исходной задачи.

$\forall x \in \Omega$ по лемме \exists БП $y : \langle c, x \rangle \geq \langle c, y \rangle \geq \langle c, x_* \rangle$.

Что и требовалось доказать.

Пример 1.3.1

$$x_1 - 8x_2 - 5x_3 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 = 2$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1:3$$

Ω ограничено в силу первого ограничения и знаковых условий $\Rightarrow \inf f(x) > -\infty$.

Носители	базисный план	знач-е целевой функции
$\{1\}, \{2\}, \{3\}$	нет	
$\{1, 2\}$	$(1, 1, 0)$	-7
$\{1, 3\}$	нет в силу 2-го ограничения	
$\{2, 3\}$	$(0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$	-7
$\{1, 2, 3\}$	нет[столбцы не могут быть лин. независимыми]	

Ответ: оптимальные базисные планы – $(1, 1, 0)$ и $(0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$; $f_* = -7$.

Задачи

10

$$\begin{aligned}
 -x_1 + 2x_2 - x_3 &\rightarrow \inf \\
 x_1 + 4x_2 + x_3 &= 5 \\
 x_1 - 2x_2 - x_3 &= -1 \\
 x_j &\geq 0, \quad j \in 1 : 3
 \end{aligned}$$

11

$$\begin{aligned}
 -x_1 + 4x_2 - 5x_3 &\rightarrow \inf \\
 -x_1 + x_2 + x_3 &\geq -2 \\
 2x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\
 x_1 &\geq 0, \quad x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

12* Параметрическая задача линейного программирования

$$\begin{aligned}
 ax_1 + x_2 + x_3 &\rightarrow \inf \\
 x_1 - x_2 + (a-1)x_3 &= a-2 \\
 x_1 + x_2 + (a+1)x_3 &= a+2 \\
 x_j &\geq 0, \quad j \in 1 : 3
 \end{aligned}$$

Построить график экстремальных (оптимальных) значений целевой функции как $F(a)$.

Замечание 1.3.1 (общее замечание)

Если x – БП, то $|N_+(x)| \leq |M|$.

Если $|N_+(x)| = |M|$, то БП x называется **невырожденным**.

Пример 1.3.2

$$\begin{aligned}
 -x_1 + x_2 - x_3 &\rightarrow \inf \\
 x_1 + x_2 + 2x_3 &= 2 \\
 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\
 x_j &\geq 0, \quad j \in 1 : 3
 \end{aligned}$$

Ограниченнность целевой функции снизу и сверху очевидна $\implies \Omega$ ограничено. Действуем методом перебора носителей.

Носители	БП	Значения целевой функции
{1}, {2}	нет	
{3}	(0, 0, 1)	-1
{1, 2}	(1, 1, 0)	0

Нет такого x , одновременно равного 2 и 1/2. Остается 0. У {2} нет тоже. У {3} есть, проверим базисность. У {1, 2} – проверяем.
У {1, 3}, {2, 3} x_1 и $x_3 \geq 0$, но 0.

Ответ: (0, 0, 1) – оптимальный план (вырожденный), $f_* = -1$.

Пример 1.3.3

$$\begin{aligned} -x_2 &\rightarrow \inf \\ -x_1 + x_2 &= 1 \\ x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Базисный план: $(0, 1)$.

$f(0, 1) = -1$ — мы не нашли решение, поскольку f не ограничена сверху.

Множество планов: $(x_2 - 1, x_2)$, $x_2 > 1$; $x_2 \rightarrow +\infty \Rightarrow f \rightarrow -\infty$

Сравни со следующей задачей:

$$\begin{aligned} x_2 &\rightarrow \inf \\ -x_1 + x_2 &= 1 \end{aligned}$$

$(0, 1)$ — оптимальный БП

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, f \geq 0$

А так как это единственный базисный план, то он оптимален.

Общая задача линейного программирования:

$$\begin{aligned} f(x) &:= c[N] \times x[N] \rightarrow \inf \\ \Omega &\left\{ \begin{array}{l} A[M_1, N] \times x[N] = b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2] \\ x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1] \end{array} \right. \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

Теорема 1.3.2

Если $\Omega \neq \emptyset$ и $\inf_{x \in \Omega} f(x) > -\infty$, то \exists оптимальный план.

Доказательство.

Рассмотрим эквивалентную задачу:

$$\begin{aligned} \langle c_0, v \rangle &\rightarrow \inf \\ A_0 v &= b, v \geq 0 \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

По эквивалентности у (1.3.5) множество планов не пусто и в нем есть оптимальный.

Что и требовалось доказать.

Задача

13*

$$\Omega = \{x \in R^N \mid Ax = b, x \geq \mathbb{O}\}$$

Доказать, что понятие базисного плана равносильно понятию крайней (угловой) точки. Крайняя точка:

$$x_0 \in \Omega, \quad x_0 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \quad x_1 \in \Omega, \quad x_2 \in \Omega \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2$$

1.4 Линейные неравенства

Определение 1.4.1 $K \subset \mathbb{R}^N$ – конус (в начале координат).

$x \in K \Rightarrow tx \in K \quad \forall t > 0$

K^+ – сопряженный конус. $K^+ = \{u \in \mathbb{R}^N \mid \langle u, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in K\}$

Теорема 1.4.1 (теорема Фаркаша).

$$K = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \langle a_i, x \rangle \geq 0, i \in M\} \Rightarrow K^+ = \text{cone}(\{a_i\}_{i \in M}) = \{u = \sum_{i \in M} t_i a_i \mid t_i \geq 0, i \in M\}$$

Двумерный случай:

$$K : \begin{cases} \langle a_1, x \rangle \geq 0 \\ \langle a_2, x \rangle \geq 0 \end{cases} \Rightarrow K^+ = \text{cone}(a_1, a_2)$$

$$u \in K^+ : u = t_1 a_1 + t_2 a_2, t_1, t_2 \geq 0$$




Рис. 1.4.1: Двумерный случай

Лемма 1.4.1

$$\begin{aligned} A &= A[M, N] \\ Ax &= b, \quad x \geq 0 \end{aligned} \tag{1.4.1}$$

(1.4.1) совместна \Leftrightarrow

$$\langle b, u \rangle \geq 0 \quad \forall u : uA \geq \mathbb{O} \quad (\text{или } A^T u \geq \mathbb{O}). \tag{1.4.2}$$

Доказательство.

(1.4.1) совместна $\Leftrightarrow \sum_{j \in N} x[j] A_j = b, x[j] \geq 0, j \in N (A_j = A[M, j]) \Leftrightarrow b \in \underbrace{\text{cone}(\{A_j\}_{j \in M})}_{\Gamma}$

Введем конус $K = \{u \in \mathbb{R}^M \mid \langle b, u \rangle \geq 0\} = \{u \mid uA \geq \mathbb{O}\}$

$K^+ = \Gamma$ по теореме Фаркаша (теорема 1.4.1).

(1.4.1) совместна $\Leftrightarrow b \in \Gamma \Leftrightarrow b \in K^+ \Leftrightarrow \langle b, u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in K, K = \{u \mid uA \geq \mathbb{O}\}.$

Что и требовалось доказать.

Замечание 1.4.1 (1.4.2) \Leftrightarrow

$$\langle b, u \rangle \leq 0 \quad \forall u : uA \leq \mathbb{O}. \tag{1.4.3}$$

$$\left(\begin{aligned} \Rightarrow: uA \leq \mathbb{O} &\Rightarrow (-u)A \geq \mathbb{O} \Rightarrow \langle (-u), b \rangle \geq 0 \Rightarrow \langle u, b \rangle \leq 0. \\ \Leftarrow: \text{столъ же очевидно.} & \end{aligned} \right)$$

(1.4.1) совместна $\Rightarrow \langle b, u \rangle \leq 0 \quad \forall u : uA \leq \mathbb{O}.$

Теорема 1.4.2 Система

$$\begin{aligned} A[M_1, N] \times x[N] &\geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] &= b[M_2] \\ x[N_1] &\geq \mathbb{O}[N_1] \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

совместна $\iff \langle b, u \rangle \leq 0 \forall u \in \mathbb{R}^M$:

$$\begin{aligned} u[M] \times A[M, N_1] &\leq \mathbb{O}[N_1] \\ u[M] \times A[M, N_1] &= \mathbb{O}[N_2] \\ u[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned} \quad (1.4.5)$$

Доказательство.

Совместность (1.4.4) эквивалентна совместности

$$A_0 = b, v \geq 0, \quad (1.4.6)$$

где $A_0 = (A[M, N_1], A[M, N_2], -A[M, N_2], -E[M, N_2])$.

По лемме (1.4.6) совместна $\iff \langle b, u \rangle \leq 0 \forall u : uA_0 \leq \mathbb{O} \iff (1.4.5)$

$$\begin{aligned} u[M] \times A[M, N_1] &\leq \mathbb{O}[N_1] \\ \left. \begin{aligned} u[M] \times A[M, N_2] &\leq \mathbb{O}[N_2] \\ -u[M] \times A[M, N_2] &\leq \mathbb{O}[N_2] \end{aligned} \right\} &\implies U[M] \times A[M, N_2] = \mathbb{O}[N_2] \\ -u[M] \times E[M, M_1] &\leq \mathbb{O}[M_1] \iff u[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1]. \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Замечание 1.4.2 (1.4.4) несовместна $\iff \exists u$, удовлетворяющее (1.4.5).

Следствие 1.4.1 (теорема Фань-Цзы).

$Ax \geq b$ совместна $\iff \langle b, u \rangle \leq 0$

$\forall u : uA = \mathbb{O}, u \geq \mathbb{O}$ ($A^T u = \mathbb{O}, u \geq \mathbb{O}$)

Условия на множества: $M_2 = \emptyset, M_1 = M, N_1 = \emptyset, N_2 = N$.

Задача

14

$$A[M, N]$$

Доказать: $Ax = b$ совместна \iff

$$\iff \langle b, u \rangle = 0 \quad \forall u : A^T u = \mathbb{O}.$$

1.5 Критерий оптимальности

Лемма 1.5.1 (основная лемма ЛП)

$$\begin{cases} \langle c, x \rangle = \mu \\ Ax = b \\ x \geq \mathbb{O} \end{cases} \quad (1.5.1)$$

$$A = A[M, N]$$

Пусть система (1) совместна, однако становится несовместной при замене μ на $\mu - \lambda \forall \lambda > 0$. Тогда совместна система

$$uA \leq c, \quad \langle b, u \rangle = \mu. \quad (1.5.2)$$

Доказательство.

$$\begin{cases} \langle c, x \rangle - t\mu = -1 \\ Ax - tb = \mathbb{O} \\ x \geq \mathbb{O}, \quad t > 0 \end{cases} \quad (1.5.3)$$

Докажем, что система (1.5.3) несовместна.

От противного: пусть (x_0, t_0) удовлетворяет (1.5.3).

1.

$$t_0 = 0. \quad \langle c, x_0 \rangle = -1, \quad Ax_0 = \mathbb{O}, \quad x_0 \geq \mathbb{O}$$

Пусть y_0 удовлетворяет (1.5.1). Тогда $x_1 := y_0 + x_0$.

$$\langle c, x_1 \rangle = \langle c, y_0 \rangle + \langle c, x_0 \rangle = \mu - 1; \quad Ax_1 = b, \quad x_1 \geq \mathbb{O}$$

Противоречие условию.

2.

$$t_0 > 0. \quad x_1 := \frac{x_0}{t_0}$$

Пусть y_0 удовлетворяет (1.5.1). Тогда $x_1 := y_0 + x_0$.

$$\langle c, x_1 \rangle = \mu - \frac{1}{t_0}; \quad Ax_1 = b, \quad x_1 \geq \mathbb{O}$$

Противоречие условию.

Итак, система (1.5.3) несовместна.

$$\begin{matrix} \gamma \\ u \end{matrix} \left| \begin{pmatrix} -c & \mu \\ A & -b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \right. = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \geq \mathbb{O}, \quad t \geq 0 \quad (3')$$

$$\begin{pmatrix} -c \\ A \end{pmatrix} \times x = \begin{pmatrix} -\mu \\ b \end{pmatrix}, \quad x \geq \mathbb{O} \quad (1')$$

$(3')$ несовместна, $(1')$ совместна.

В силу несовместности $(3')$ (см. лемму 1.4.1):

$$\exists(\gamma_0, u_0) : -\gamma_0 c + u_0 A \leq \mathbb{O}, \quad \gamma_0 \mu - \langle b, u_0 \rangle \leq 0, \quad \gamma_0 > 0.$$

В силу совместности (1') и условия $-\gamma_0 c + u_0 A \leq \mathbb{O}$:

$$-\gamma_0 \mu + \langle b, u_0 \rangle \leq 0.$$

Получили:

$$\begin{aligned} -\gamma_0 \mu + \langle b, u_0 \rangle &= 0; \quad -\gamma_0 c + u_0 A \leq \mathbb{O} \\ u_* := \frac{u_0}{\gamma_0}; \quad u_* A &\leq c, \quad \langle b, u_* \rangle = \mu \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

$$f(x) := c[N] \times x[N] \rightarrow \inf \tag{1.5.4}$$

$$\Omega : \begin{cases} A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2] \\ x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1] \end{cases}$$

Теорема 1.5.1 (критерий оптимальности).

$x_* \in \Omega$ – оптимальный план (1.5.4) $\iff \exists u_* = u_*[M] :$

$$\langle c, x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle \tag{1.5.5}$$

$$\begin{cases} u_*[M] \times A[M, N_1] \leq c[N_1] \\ u_*[M] \times A[M, N_2] = c[N_2] \\ u_*[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1] \end{cases} \tag{1.5.6}$$

Доказательство.

Необходимость. $x_* \in \Omega$ – оптимальный план (1.5.4).

Запишем эквивалентную задачу:

$$\begin{cases} \langle c_0, v \rangle \rightarrow \inf \\ A_0 v = b \\ v \geq \mathbb{O} \end{cases} \tag{1.5.7}$$

По эквивалентности у (1.5.7) \exists оптимальный план v_* и $\langle c, x_* \rangle = \langle c_0, v_* \rangle =: \mu$.

$$\begin{cases} \langle c_0, v \rangle = \mu \\ A_0 v = b \\ v \geq \mathbb{O} \end{cases} -$$

этота система совместна (v_*), при уменьшении μ становится несовместной.

$$\begin{aligned} \text{По лемме 1.5.1 } \exists u_* : \quad & \underbrace{u_* A_0 \leq c_0}_{\iff (1.5.6)}, \quad \underbrace{\langle b, u_* \rangle = \mu = \langle c, x_* \rangle}_{(1.5.5)} \end{aligned}$$

$$A_0 = (A[M, N_1] \quad A[M, N_2] \quad -A[M, N_2] \quad -E[M, M_1])$$

$$c_0 = (c[N_1] \quad c[N_2] \quad -c[N_2] \quad \mathbb{O}[M_1])$$

$$u_* A_0 \leq c_0 :$$

$$u_*[M] \times A[M, N_1] \leq c[N_1]$$

$$\left. \begin{aligned} u_*[M] \times A[M, N_2] &\leq c[N_2] \\ -u_*[M] \times A[M, N_2] &\leq -c[N_2] \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_*[M] \times A[M, N_2] = c[N_2]$$

$$-u_*[M] \times E[M, M_1] \leq \mathbb{O}[M_1] \iff u_*[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1]$$

Достаточность. Выполнены (1.5.5), (1.5.6).

$$\begin{aligned}
 & \forall x \in \Omega \quad \langle c, x \rangle = c[N_1] \times x[N_1] + c[N_2] \times x[N_2] \stackrel{(1.5.6)}{\geq} \\
 & \geq u_*[M] \times A[M, N_1] \times x[N_1] + u_*[M] \times A[M, N_2] \times x[N_2] = u_*[M] \times (A[M, N] \times x[N]) = \\
 & = u_*[M_1] \times (A[M_1, N] \times x[N]) + u_*[M_2] \times (A[M_2, N] \times x[N]) \geq \\
 & \geq u_*[M_1] \times b[M_1] + u_*[M_2] \times b[M_2] = \langle b, u_* \rangle \stackrel{(1.5.5)}{=} \langle c, x_* \rangle
 \end{aligned}$$

Итак, $\forall x \in \Omega \quad \langle c, x_* \rangle \leq \langle c, x \rangle$.

Что и требовалось доказать.

$$\begin{aligned}
 \Lambda = \{u \mid & \\
 & u[M] \times A[M, N_1] \leq c[N_1] \\
 & u[M] \times A[M, N_2] = c[N_2] \\
 & u[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1]
 \end{aligned}$$

}

Критерий оптимальности: $x_* \in \Omega$ – оптимальный план $\iff \exists u_* \in \Lambda : \langle c, x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle$.

Отметим, что

$$\langle c, x \rangle \geq \langle b, u \rangle \quad \forall x \in \Omega, u \in \Lambda \quad (1.5.8)$$

(см. доказательство достаточности: $\langle c, x \rangle \stackrel{N=N_1 \cup N_2}{\geq} \langle uA, x \rangle = \langle u, Ax \rangle \stackrel{M=M_1 \cup M_2}{\geq} \langle u, b \rangle$).

1.6 Теорема двойственности

$$f(x) := \langle c, x \rangle \rightarrow \inf_{x \in \Omega} \quad (1.6.1)$$

$$\Lambda, \quad g(u) = \langle b, u \rangle$$

Критерий оптимальности: $x_* \in \Omega$ оптимален $\iff \exists u_* \in \Lambda : \langle c, x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle$.

Известно, что $f(x) \geq g(u) \quad \forall x \in \Omega \quad \forall u \in \Lambda$.

В частности, при $u \in \Lambda \quad g(u) \leq f(x_*) = g(u_*)$,
т.е. – решение задачи ЛП

$$g(u) := \langle b, u \rangle \rightarrow \sup_{u \in \Lambda} \quad (1.6.2)$$

В силу критерия оптимальности (1.5.1) по решению x_* задачи (1.6.1) находитется u_* – решение задачи (1.6.2);
более того,

$$\inf_{x \in \Omega} f(x) = \sup_{u \in \Lambda} g(u) \quad (1.6.3)$$

Определение 1.6.1 (1.6.2) называется задачей, *двойственной* к (1.6.1).

Подробнее:

$$\begin{aligned} g(u) &:= b[M] \times u[M] \rightarrow \sup \\ &\left. \begin{aligned} u[M] \times A[M, N_1] &\leq c[N_1] \\ u[M] \times A[M, N_2] &= c[N_2] \\ u[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned} \right\} \end{aligned} \quad (2')$$

(1.6.2) [(2')] имеет решение u_* . Покажем, что (1.6.1) имеет решение и выполняется (1.6.3) – соотношение двойственности. u_* является решением следующей задачи:

$$\begin{aligned} -\langle b, u \rangle &\rightarrow \inf \\ -A^T[N_1, M] \times u[M] &\geq -c[N_1] \\ -A^T[N_2, M] \times u[M] &= -c[N_2] \\ u[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned}$$

По критерию оптимальности 1.5.1 $\exists x_* = x_*[N] :$

$$\begin{aligned} -\langle b, u_* \rangle &= -\langle c, x_* \rangle \\ -x_*[N] \times A^T[N, M_1] &\leq -b[M_1] \\ -x_*[N] \times A^T[N, M_2] &= -b[M_2] \\ x_*[N_1] &\geq \mathbb{O}[N_1] \\ &\Downarrow \\ \langle b, u_* \rangle &= \langle c, x_* \rangle \\ A[M_1, N] \times x_*[N] &\geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x_*[N] &= b[M_2] \end{aligned}$$

$$x_*[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1]$$

$$x_* \in \Omega, \quad u_* \in \Lambda, \quad \langle c, x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle$$

По критерию оптимальности 1.5.1 для (1.6.1) x – оптимальный план и выполняется (1.6.3).

Таким образом, нами доказана

Теорема 1.6.1 (I теорема двойственности).

Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение; при этом выполняется (1.6.3).

Теорема 1.6.2 Обе двойственные задачи (1.6.1) и (1.6.2) одновременно имеют решение $\Leftrightarrow \Omega \neq \emptyset$ и $\Lambda \neq \emptyset$.

Доказательство достаточности.

$\Omega \neq \emptyset$ по условию

$\Lambda \neq \emptyset \quad \exists$ план u_0 задачи (1.6.2).

$$f(x) \geq g(u_0) \quad \forall x \in \Omega \quad \Rightarrow \quad \inf_{x \in \Omega} f(x) > -\infty.$$

По теореме существования 1.3.1 \exists оптимальный план задачи (1.6.1).

По первой теореме двойственности 1.6.1 (1.6.2) тоже имеет решение.

Что и требовалось доказать.

Пример 1.6.1 Исследовать задачу ЛП:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 1$$

$$x_1 - x_2 = 2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\begin{array}{c|cc} u_1 & x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 1 \\ u_2 & x_1 - x_2 = 2 \end{array}$$

$$c = (1, 2, 3)$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Запишем двойственную задачу:

$$u_1 + 2u_2 \rightarrow \sup$$

$$u_1 + u_2 \leq 1$$

$$u_1 - u_2 = 2$$

$$-4u_1 = 3$$

$$u_1 \geq 0$$

$$\Lambda = \emptyset; \quad \Omega \neq \emptyset : \quad x_0 = (2, 0, 0)$$

Целевая функция исходной задачи неограничена снизу.

Можно построить двойственную задачу к двойственной задаче (мы вернемся к исходной задаче).

$$u_1 + 2u_2 \rightarrow \sup$$

$$\begin{array}{c|cc} x_1 & u_1 + u_2 \leq 1 \\ x_2 & u_1 - u_2 = 2 \\ x_3 & -4u_1 = 3 \end{array}$$

При переходе к двойственной задаче учитываются следующие правила:

$\inf \leftrightarrow \sup$, " \geq " – "правильное" ограничение-неравенство в задаче на \inf ,
 " \leq " – "правильное" ограничение-неравенство в задаче на \sup , " \geq " – "правильное" знаковое ограничение.

Правильным знаковым ограничениям соответствуют правильные ограничения-неравенства, и наоборот.

Теорема 1.6.3 (II теорема двойственности).

x_0, u_0 – планы двойственных задач.

x_0, u_0 оптимальны \iff выполняются условия дополнительности:

$$\langle u_0, Ax_0 - b \rangle = 0 \quad (1.6.4)$$

$$\langle c - u_0 A, x_0 \rangle = 0 \quad (1.6.5)$$

Доказательство.

Необходимость.

$$\langle c, x_0 \rangle \stackrel{N=N_1 \cup N_2}{\geq} \langle u_0 A, x_0 \rangle = \langle u_0, Ax_0 \rangle \stackrel{M=M_1 \cup M_2}{\geq} \langle u_0, b \rangle$$

$$x_0, u_0 \text{ оптимальны} \Rightarrow \langle c, x_0 \rangle = \langle b, u_0 \rangle$$

Достаточность.

Следует из критерия оптимальности 1.5.1 для (1.6.1) и первой теоремы двойственности 1.6.1.

Что и требовалось доказать.

(1.6.4), (1.6.5) эквивалентны соответственно

$$u_0[i] \times (A[i, N] \times x_0[N] - b[i]) = 0, \quad i \in M_1 \quad (4')$$

$$(c[j] - u_0[M] \times A[M, j]) \times x_0[j] = 0, \quad j \in N_1, \quad (5')$$

так как

$$(1.6.4) \iff \sum_{i \in M_1} u_0[i] \times (A[i, N] \times x_0[N] - b[i]) = 0 \Rightarrow \text{все слагаемые равны.}$$

$$(4'), (5') \iff$$

$$\iff u_0[M] \times A[M, j] = c[j], \quad \text{если } x_0[j] > 0 \ (j \in N_1)$$

$$u_0[i] = 0, \quad \text{если } A[i, N] \times x_0[N] > b[i] \ (i \in M_1)$$

С другой стороны, (4'), (5') \iff

$$\iff A[i, N] \times x_0[N] = b[i], \quad \text{если } u_0[j] > 0 \ (i \in M_1)$$

$$x_0[j] = 0, \quad \text{если } u_0[M] \times A[M, j] < c[j] \ (j \in N_1)$$

Пример 1.6.2 Исследовать задачу ЛП:

$$x_1 - 8x_2 - 4x_3 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 = 2$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 3$$

Проверить план $\hat{x} = (1, 1, 0)$ на оптимальность.

$$\hat{x} \in \Omega$$

$$2u_1 \rightarrow \sup$$

$$u_1 + u_2 \leq 1$$

$$u_1 - u_2 \leq -8$$

$$4u_1 + 2u_2 \leq -4$$

Запишем условия дополнительности:

$$u_1 + u_2 = 1, \quad u_1 - u_2 = -8 \Rightarrow u_1 = -\frac{7}{2}, \quad u_2 = \frac{9}{2}$$

Проверяем 3-е ограничение: $-14 + 9 = -5 \leq -4$

$\hat{u} = (u_1, u_2)$ – план двойственной задачи, выполнены условия дополнительности.

Значит, \hat{x} , \hat{u} – оптимальные планы.

Задачи

15 Исследовать задачу линейного программирования:

$$x_1 - 3x_2 + x_3 \rightarrow \inf$$

$$2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 2$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

16 Построить пару двойственных задач линейного программирования, у которых множества планов пусты.

17*

$$\begin{aligned} -x_1 - 2x_2 + x_3 &\rightarrow \sup \\ x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 &\leq 1 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Проверить план $\hat{x} = (0, 0, -2)$ на оптимальность.

18*

$$\begin{aligned} \langle c, x \rangle &\rightarrow \inf \\ Ax = b, \quad x \in K \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle b, u \rangle &\rightarrow \sup \\ c - uA &\in K^+ \\ K \subset \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

K – конус, K^+ – сопряженный конус

Доказать: если x_0, u_0 – планы и $\langle c, x_0 \rangle = \langle b, u_0 \rangle$, то x_0, u_0 оптимальны.

Пример 1.6.3

$$\begin{aligned} -x_1 + 3x_2 - 3x_3 + x_4 &\rightarrow \sup \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &\leq 2 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 &\leq -1 \\ x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 4 \end{aligned}$$

Проверить план $\hat{x} = (0, 1, 1, 0)$ на оптимальность.

(Задача в симметричной форме: все ограничения – неравенства, есть все знаковые ограничения.)

$$\hat{x} \in \Omega$$

$$\begin{aligned} 2u_1 - u_2 &\rightarrow \inf \\ u_1 + u_2 &\geq -1 \\ u_1 + 2u_2 &\geq 3 \\ u_1 - 4u_2 &\geq -3 \\ u_1 + u_2 &\geq 1 \\ u_1 \geq 0, \quad u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Условия дополнительности:

$$\left. \begin{array}{l} u_1 + 2u_2 = 3 \\ u_1 - 4u_2 = -3 \end{array} \right\} \text{ из знаковых ограничений}$$

$u_2 = 0$ – из неравенств

Система несовместна; \hat{x} не оптимален.

Пример 1.6.4

$$-x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 2$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 3$$

$\hat{x} = (0, 0, 1)$ – оптимальны?

Ограничения двойственной задачи:

$$u_1 + 2u_2 \leq -1$$

$$u_1 - u_2 \leq 1$$

$$2u_1 + u_2 \leq -1$$

Условия дополнительности для \hat{x} :

$$2u_1 + u_2 = -1; \Rightarrow u_2 = -2u_1 - 1$$

Проверяем первое и второе ограничения двойственной задачи:

$$-3u_1 \leq 1, \quad 3u_1 \leq 0 \iff u_1 \in [-\frac{1}{3}, 0]$$

$(u_1, -2u_1 - 1)$ при $u_1 \in [-\frac{1}{3}, 0]$ является планом двойственной задачи,

выполнено условие дополнительности $\Rightarrow \hat{x}$ – оптимальный план.

$\hat{x} = (1, 1, 0)$ – оптимален ли?

$$u_1 + 2u_2 = -1$$

$$u_1 - u_2 = 1$$

$$u_1 = \frac{1}{3}, \quad u_2 = -\frac{2}{3}$$

Проверив 3-е ограничение, увидим, что оно не выполняется; \hat{x} не оптимален.

Задачи

19

$$c[N] \times x[N] \rightarrow \inf$$

$$A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1]$$

$$A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2]$$

$$A[M_3, N] \times x[N] \leq b[M_3]$$

$$x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1]$$

$$x[N_3] \leq \mathbb{O}[N_3]$$

$$M = M_1 \cup M_2 \cup M_3, \quad N = N_1 \cup N_2 \cup N_3, \quad M_i, N_i \text{ dis}$$

$$b[M] \times u[M] \rightarrow \sup$$

$$u[M] \times A[M, N_1] \leq c[N_1]$$

$$u[M] \times A[M, N_2] = c[N_2]$$

$$u[M] \times A[M, N_3] \geq c[N_3]$$

$$u[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1]$$

$$u[M_3] \leq \mathbb{O}[M_3]$$

x_0, u_0 – планы этих задач

Доказать: $\langle c, x_0 \rangle = \langle b, u_0 \rangle \Rightarrow x_0, u_0$ – оптимальные планы

20*

$$\sum_{j \in N} |x[j]| \rightarrow \inf$$

$$Ax = b$$

$b \neq \mathbb{O}$, ограничения совместны

$$\langle b, u \rangle \rightarrow \sup$$

$$\max_{j \in N} |u[M] \times A[M, j]| \leq 1$$

Доказать, что обе задачи имеют решения и их экстремальные значения равны.

1.7 Матричные игры

$A = A[M, N]$ – матрица платежей

Стратегия I игрока: $p = p[M] : \sum_{i \in M} p[i] = 1, p[i] \geq 0, i \in M$

P – множество стратегий I игрока

Стратегия II игрока: $q = q[N] : \sum_{j \in N} q[j] = 1, q[j] \geq 0, j \in N$

Q – множество стратегий II игрока

Определим $a(p, q)$ – среднюю величину платежа в каждой партии.

В случае $p = e_i, q = e_j \quad a(e_i, e_j) = A[i, j]$

$$a(e_i, q) = \sum_{j \in N} A[i, j] \times q[j]$$

$$a(p, e_j) = \sum_{i \in M} p[i] \times A[i, j]$$

$$a(p, q) = \sum_{j \in N} (p[M] \times A[M, j]) \times q[j] = p[M] \times A[M, N] \times q[N]$$

Фиксируем p . $\varphi(p) = \min_{q \in Q} a(p, q)$ – гарантированный выигрыш.

I игрок выбирает $p_* \in P$:

$$\varphi(p_*) = \max_{p \in P} \varphi(p) = \max_{p \in P} \min_{q \in Q} a(p, q) \quad (1.7.1)$$

Фиксируем q . $\psi(q) = \max_{p \in P} a(p, q)$.

II игрок выбирает $q_* \in Q$:

$$\psi(q_*) = \min_{q \in Q} \psi(q) = \min_{q \in Q} \max_{p \in P} a(p, q) \quad (1.7.2)$$

Теорема 1.7.1 (о существовании ситуации равновесия).

Стратегии p_*, q_* существуют.

При этом пара $\{p_*, q_*\}$ образует ситуацию равновесия:

$$a(p, q_*) \leq a(p_*, q_*) \leq a(p_*, q) \quad \forall p \in P \quad \forall q \in Q \quad (1.7.3)$$

Лемма 1.7.1 (лемма об очистке). Справедливы равенства

$$\varphi(p) = \min_{j \in N} p[M] \times A[M, j] \quad \forall p \in P \quad (1.7.4)$$

$$\psi(q) = \max_{i \in M} A[i, N] \times q[N] \quad \forall q \in Q \quad (1.7.5)$$

Доказательство.

$$\varphi(p) \quad a(p, q) \rightarrow \inf_{q \in Q}$$

p фиксировали

$$(p[M] \times A[M, N]) \times q[N] \rightarrow \inf$$

$$\sum_{j \in N} q[j] = 1$$

$$q[N] \geq \mathbb{O}[N]$$

Решение существует в силу ограниченности множества планов.
По теореме о существовании решения 1.3.1 найдется оптимальный **базисный** план.

Все множество базисных планов: $\{e_j\}, j \in N$.

$$\varphi(p) = \min_{j \in N} a(p, e_j) = \min_{j \in N} p[M] \times A[M, j].$$

Что и требовалось доказать.

Задача для I игрока:

$$\varphi(p) = \min_{j \in N} \underbrace{p[M] \times A[M, j]}_t \rightarrow \sup_{p \in P} \quad (1.7.6)$$

$$\psi(q) = \max_{i \in M} \underbrace{A[i, N] \times q[N]}_s \rightarrow \inf_{q \in Q} \quad (1.7.7)$$

(1.7.6) эквивалентна

$$t \rightarrow \sup \quad (1.7.8)$$

$$-p[M] \times A[M, j] + t \leq 0, \quad j \in N$$

$$\sum_{i \in M} p[i] = 1$$

$$p[M] \geq \mathbb{O}[M]$$

$$(p, t)$$

(1.7.7) эквивалентна

$$s \rightarrow \inf \quad (1.7.9)$$

$$-A[i, N] \times q[N] + s \geq 0, \quad i \in M$$

$$\sum_{j \in N} q[j] = 1$$

$$q[N] \geq \mathbb{O}[N]$$

$$(q, s)$$

(1.7.8) и (1.7.9) – двойственные задачи:
(1.7.9):

	0	...	0	1	
				1	0
$p[M]$	$-A[M, N]$		\vdots	\vdots	
				1	0
t	1	...	1	0	1

$$q[N] \geq \mathbb{O}[N]$$

Множества планов у (1.7.8) и (1.7.9) непусты (из-за произвольности t и s)

$\exists (p^*, t^*), (q^*, s^*)$ – оптимальные; $t^* = s^*$ по первой теореме двойственности 1.6.1

В силу эквивалентности

$$\begin{aligned} t^* &= \varphi(p^*) \\ s^* &= \psi(q^*) \end{aligned} \Rightarrow \varphi(p^*) = \psi(q^*) \quad (1.7.10)$$

(1.7.10) \iff

$$\min_{q \in Q} a(p^*, q) = \max_{p \in P} a(p, q^*) \quad (1.7.11)$$

$$a(p^*, q^*) \leq \max_{p \in P} a(p, q^*) \stackrel{(1.7.11)}{=} \min_{q \in Q} a(p^*, q) \leq a(p^*, q^*) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \max_{p \in P} a(p, q^*) = a(p^*, q^*) = \min_{q \in Q} a(p^*, q) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a(p, q^*) \leq a(p^*, q^*) \leq a(p^*, q)$$

Этим мы доказали теорему о существовании равновесия.

Замечание 1.7.1 По определению $\varphi(p^*)$ и $\psi(q^*)$ и по доказанной выше теореме 1.7.1

$$\max_{p \in P} \min_{q \in Q} a(p, q) = \min_{q \in Q} \max_{p \in P} a(p, q)$$

(Это утверждение наз. теоремой о существовании равновесия, или теоремой фон Неймана, или теоремой минимакса и максимина.)

Задача

21

$$A = A[M, N]$$

Доказать:

$$\max_{i \in M} \min_{j \in N} A[i, j] \leq \min_{j \in N} \max_{i \in M} A[i, j]$$

Привести пример, когда неравенства выполняются как строгие.

1.8 Принцип максимума для линейных дискретных систем

$$\sum_{k=1}^s \langle c_k, x_k \rangle + \sum_{k=1}^s \langle b_k, u_k \rangle \rightarrow \sup \quad (1.8.1)$$

$$p_k \mid x_k = A_{k-1}x_{k-1} + B_k u_k, \quad k \in 1 : s \quad (1.8.2)$$

$$q_k \mid D_k u_k \leq d_k, \quad k \in 1 : s \quad (1.8.3)$$

$$x_0 = \hat{x} \quad (1.8.4)$$

$$A_k = A_k[N, N], \quad B_k = B_k[N, M], \quad D_k = D_k[T, M]$$

	u_1	x_1	u_2	x_2	u_3	x_3	\dots	x_{s-1}	u_s	x_s	
	b_1	c_1	b_2	c_2	b_3	c_3	\dots	c_{s-1}	b_s	c_s	
p_1	$-B_1$	E	0	0	0	0	\dots	0	0	0	$A_0 \hat{x}$
q_1	D_1	0	0	0	0	0	\dots	0	0	0	$\leq d_1$
p_2	0	$-A_1$	$-B_2$	E	0	0	\dots	0	0	0	$= 0$
q_2	0	0	D_2	0	0	0	\dots	0	0	0	$\leq d_2$
p_3	0	0	0	$-A_2$	$-B_3$	E	\dots	0	0	0	$= 0$
.	\dots
p_s	0	0	0	0	0	0	\dots	$-A_{s-1}$	$-B_s$	E	$= 0$
q_s	0	0	0	0	0	0	\dots	0	D_s	0	$\leq d_s$

$$\langle A_0 \hat{x}, p_1 \rangle + \sum_{k=1}^s \langle d_k, q_k \rangle \rightarrow \inf \quad (1.8.5)$$

$$-p_k B_k + q_k D_k = b_k, \quad k \in 1 : s$$

$$p_k - p_{k+1} A_k = c_k, \quad k \in 1 : s-1$$

$$p_s = c_s$$

$$q_k \geq \mathbb{O}, \quad k \in 1 : s$$

$$p_k = p_{k+1} A_k + c_k, \quad k = s-1, \dots, 1 \\ p_s = c_s \quad (1.8.6)$$

(1.8.6): по предыдущим координатам однозначно определяется p_k

$$(1.8.5) \Rightarrow \sum_{k=1}^s \langle d_k, q_k \rangle \rightarrow \inf$$

$$D_k^T q_k = B_k^T p_k + b_k, \quad k \in 1 : s$$

$$q_k \geq \mathbb{O}, \quad k \in 1 : s$$

(1.8.5) распадается на s независимых задач ЛП:

$$\langle d_k, q_k \rangle \rightarrow \inf \quad (1.8.7)$$

$$u_k \mid D_k^T q_k = B_k^T p_k + b_k \\ q_k \geq \mathbb{O}$$

Двойственная задача:

$$H_k(u_k) = \langle B_k^T p_k + b_k, u_k \rangle \rightarrow \sup \quad (1.8.8)$$

$$U_k : D_k u_k \leq d_k$$

$(U_k$ – множество планов (1.8.8))

$H_k(u_k) = \langle b_k, u_k \rangle + \langle p_k, B_k u_k \rangle$ – функция Гамильтона

Теорема 1.8.1 (принцип максимума)

$\{u_k^*\}_{k=1}^s$ – система допустимых управлений для (1.8.1).

$\{u_k^*\}_{k=1}^s$ оптимальна $\iff H_k(u_k^*) = \max_{u_k \in U_k} H_k(u_k)$ при $k \in 1 : s$.

Переформулировка: u_k^* – решение (1.8.8).

$$\left[\begin{array}{l} x_k = A_{k-1} x_{k-1} + B_k u_k \\ D_k u_k \leq d_k, \quad k \in 1 : s \end{array} \right. \quad (1.8.9)$$

Ограничения двойственной задачи:

$$D_k^T q_k = B_k^T p_k + b_k, \quad q_k \geq \mathbb{O}, \quad k \in 1 : s \quad (1.8.10)$$

$$p_k = p_{k+1} A_k + c_k, \quad k \in 1 : s - 1$$

$$p_s = c_s$$

Серия задач при каждом $k \in 1 : s$

$$\langle d_k, q_k \rangle \rightarrow \inf \quad (1.8.11)$$

$$\left[\begin{array}{l} D_k^T q_k = B_k^T p_k + b_k \\ q_k \geq \mathbb{O} \\ \langle B_k^T p_k + b_k, u_k \rangle \rightarrow \sup \\ D_k u_k \leq d_k \end{array} \right. \quad (1.8.12)$$

]

Доказательство (теоремы о принципе максимума 1.8.1).

$\Rightarrow: \{x_k^*, u_k^*\}_{k=1}^s$ – оптимальный план задачи (1.8.9). По I теореме двойственности \exists решение $\{p_k, q_k^*\}$ задачи (1.8.10), по II теореме двойственности выполняется условие дополнительности.

$$\langle d_k - D_k u_k^*, q_k^* \rangle = 0 \quad \forall k \in 1 : s$$

Фиксируем $k \in 1 : s \Rightarrow q_k^*$ – план (1.8.11), u_k^* – план (1.8.12) и для них выполняется условие дополнительности:

$$\langle d_k - D_k u_k^*, q_k^* \rangle = 0$$

сл., по II теореме двойственности u_k^* – решение задачи (1.8.12).

$\Leftarrow:$ Фиксируем $\forall k. \exists u_k^*$ – решение (1.8.12). Покажем, что система $\{u_k^*\}$ – оптимальное управление (1.8.9).

u_k^* по I теореме двойственности $\exists q_k^*$ – решение (1.8.11), $\{p_k, q_k^*\}$ – план двойственной задачи (1.8.10), $\{x_k^*, u_k^*\}_{k=1}^s$ – план (1.8.9). Поскольку $\forall k$ выполняется условие дополнительности для задачи (1.8.10), указанный план является оптимальным, т.е. $\{u_k^*\}$ оптимальна

Что и требовалось доказать.

Задача

22* $A = A[N, N]$ — неособая.
 $B = xy^T$, x, y — ненулевые векторы.
Доказать, что

$$(A - B)^{-1} = A^{-1} + (1 - \alpha)^{-1} A^{-1} B A^{-1}, \text{ где } \alpha = \langle y, A^{-1} x \rangle \neq 1$$

1.9 Симплекс-метод

$$\begin{aligned} f(x) := c[N] \times x[N] &\rightarrow \inf \\ A[M, N] \times x[N] &= b[M] \\ x[N] &\geq \mathbb{O}[N] \end{aligned} \tag{1.9.1}$$

Двойственная задача:

$$\begin{aligned} b[M] \times u[M] &\rightarrow \sup \\ u[M] \times A[M, N] &\leq c[N] \end{aligned} \tag{1.9.2}$$

x — базисный план: $N_+ = N_+(x)$ — носитель,
 $A[M, j]$, $j \in N_+(x)$ — линейно независимы. Условие невырожденности:
для всех базисных планов x

$|N_+(x)| = |M|$ — все базисные планы невырождены.

$A[M, N_+]$ — невырожденная матрица, называется базисной матрицей, соответствующей базисному плану x .

$B[N_+, M] = (A[M, N_+])^{-1}$ — обратная базисная матрица.

$$B[N_+, M] \times A[M, N_+] = E[N_+, N_+]$$

x_0 — начальный базисный план с носителем $N_+^{(0)} = N_+(x_0)$

$x_0 \rightarrow \text{БП } x_1 : \langle c, x_1 \rangle < \langle c, x_0 \rangle$

Предварительно проверим x_0 на оптимальность. Условие оптимальности:

$$u[M] \times A[M, N_+^{(0)}] = c[N_+^{(0)}] \quad (\text{т. к. компоненты } x \text{ положительны на носителе})$$

В силу невырожденности:

$$u_0[M] = c[N_+^{(0)}] \times B[N_+^{(0)}, M] \tag{1.9.3}$$

Проверим, что u_0 — план двойственной задачи.

$$\underbrace{\Delta_0[j]}_{\text{оценки}} = u_0[M] \times A[M, j] - c[j], \quad j \in N \setminus N_+^{(0)}$$

Если $\Delta_0[j] \leq 0 \quad \forall j \in N \setminus N_+^{(0)}$, то x_0, u_0 — оптимальные планы.

Пусть $\exists j_0 \in N \setminus N_+^{(0)} : \Delta_0[j_0] > 0$

$$\Delta_0[j_0] \stackrel{(1.9.3)}{=} c[N_+^{(0)}] \times \underbrace{B[N_+^{(0)}, M] \times A[M, j_0]}_{z_0[N_+^{(0)}]} - c[j_0]$$

$$z_0[N_+^{(0)}] = B[N_+^{(0)}, M] \times A[M, j_0]$$

Иначе говоря,

$$A[M, N_+^{(0)}] \times z_0[N_+^{(0)}] = A[M, j_0] \tag{1.9.4}$$

$$z_0[j] = \begin{cases} -1 & j = j_0 \\ 0 & j \neq j_0, \quad j \in N \setminus N_+^{(0)} \end{cases}$$

$$(4) \Rightarrow Az_0 = \mathbb{O}$$

$$\Delta_0[j_0] = \langle c, z_0 \rangle > 0 \quad (\text{по усл.})$$

$$x_0(t) = x_0 - tz_0, \quad t > 0$$

$$Ax_0(t) = b \quad \forall t$$

Если $z_0[N_+^{(0)}] \leq \mathbb{O}[N_+^{(0)}]$, то $z_0 \leq \mathbb{O}$ и $x_0(t) \geq 0 \quad \forall t > 0$

$$f(x_0(t)) = f(x_0) - t \langle c, z_0 \rangle = f(x_0) - t \underbrace{\Delta_0[j_0]}_{>0} \rightarrow -\infty \quad (l \rightarrow +\infty)$$

В этом случае задача не имеет решения.

$$\exists s \in N_+^{(0)} : z_0[s] > 0$$

$$x_0 - tz_0 \geq 0 \Rightarrow$$

$$t_0 = \min \left\{ \frac{x_0[s]}{z_0[s]} : s \in N_+^{(0)}, z_0[s] > 0 \right\} > 0 \quad (1.9.5)$$

$x_1 = x_0 - t_0 z_0$ — план (1.9.1). s_0 — индекс, на котором достигается минимум в (1.9.5).

Имеем:

$$x_1[s] = x_0[s] - t_0 z_0[s], \quad s \in N_+^{(0)} \setminus \{s_0\}$$

$$x_1[j_0] = t_0 > 0 \quad \text{— носитель поменялся.}$$

$$x_1[j] = 0 \quad \text{при остальных } j \in N, \text{ в частности, } x_1[s_0] = 0 \quad (1.9.6)$$

x_1 — план задачи (1.9.1)

$$f(x_1) = f(x_0) - t_0 \Delta_0[j_0] < f(x_0)$$

Покажем, что x_1 — базисный план.

$$N_+^{(1)} = N_+^{(0)} \setminus \{s_0\} \cup \{j_0\}, \quad |N_+^{(1)}| = |M|$$

Покажем, что $A[M, N_+^{(1)}]$ — невырожденная.

— Шерман-Моррисон...

Можно проще:

$A[M, N_+^{(1)}]$ получается из $A[M, N_+^{(0)}]$ заменой s_0 — столбца на j_0 — столбец.

$$A[M, j_0] = \sum_{s \in N_+^{(0)}} z_0[s] A[M, s] \quad \Leftrightarrow (1.9.4)$$

при этом $z_0[s_0] > 0$

$C = C[1:m, 1:m]$ — обратимая
 C_j — j -й столбец; $P = \sum_{s=1}^m z_s C_s$, $z_j \neq 0$; заменили, D — полученная матрица

Лемма 1.9.1 $\exists D^{-1}, \quad D^{-1} = VC^{-1}, \quad V$ — матрица, отличающаяся от E_m только j -м столбцом

$$V_j = \left(-\frac{z_1}{z_j}, \dots, -\frac{z_{j-1}}{z_j}, \frac{1}{z_j}, -\frac{z_{j+1}}{z_j}, \dots, -\frac{z_m}{z_j} \right)^T$$

(Матрица V наз. мультипликатором.)

Доказательство.

$$D = C \begin{pmatrix} 1 & & z_1 & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & z_j & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & z_m & & 1 \end{pmatrix} = CU$$

$$D^{-1} = U^{-1}C^{-1}$$

$U^{-1} = V :$

$$\begin{pmatrix} 1 & & z_1 & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & z_j & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & z_m & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & -z_1/z_j & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & 1/z_j & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -z_m/z_j & & 1 \end{pmatrix}$$

j -й столбец UV : $(UV)_j = \frac{1}{z_j} \sum_{s \neq j} (-z_s e_s) + \frac{1}{z_j} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} =$

$$= -\frac{1}{z_j} \sum_{s \neq j} z_s e_s + \frac{1}{z_j} \sum_{s=1}^m z_s e_s = \frac{1}{z_j} z_j e_j = e_j$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & -z_1/z_j & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & 1/z_j & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -z_m/z_j & & 1 \end{pmatrix} C^{-1}$$

$$D^{-1}[j, \cdot] = C^{-1}[j, \cdot]/z_j \quad (\text{рабочая строка})$$

$$D^{-1}[s, \cdot] = C^{-1}[s, \cdot] - \left(\frac{z_s}{z_j}\right) C^{-1}[j, \cdot] = C^{-1}[s, \cdot] - z_s D^{-1}[j, \cdot], \quad s \neq j$$

Что и требовалось доказать.

$$A[M, N_+^{(0)}; \quad B_0[N_+^{(0)}, M] = (A[M, N_+^{(0)}])^{-1}$$

$$N_+^{(1)} = N_+^{(0)} \setminus \{s_0\} \cup \{j_0\}$$

$$A[M, N_+^{(1)}] : \quad \text{на место } A_{s_0} \text{ ставится } A_{j_0}$$

$$B_1[N_+^{(1)}, M] = (A[M, N_+^{(1)}])^{-1}$$

$$A[M, j_0] = \sum_{s \in N_+^{(0)}} z_0[s] A[M, s], \quad z_0[s_0] > 0$$

$$B_1[N_+^{(1)}, M] \text{ сущ. и } B_1[j_0, M] = B_0[s_0, M]/z_0[s_0]$$

$$B_1[s, M] = B_0[s, M] - z_0[s]b_1[j_0, M], \quad s \in N_+^{(0)} \setminus \{s_0\}$$

$$u_1[M] = c[N_+^{(1)}] \times B_1[N_+^{(1)}, M]$$

$$u_0[M] = c[N_+^{(0)}] \times B_0[N_+^{(0)}, M]$$

Лемма 1.9.2

$$u_1[M] = u_0[M] - \Delta_0[j_0]B_1[j_0, M]$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} u_1[M] &= \sum_{s \in N_+^{(0)} \setminus \{s_0\}} c[s]B_1[s, M] + c[j_0]B_1[j_0, M] = \\ &= \sum_{s \in N_+^{(0)} \setminus \{s_0\}} c[s](B_0[s, M] - z_0[s]b_1[j_0, M]) + c[j_0]B_1[j_0, M] = \\ &= \underbrace{\sum_{s \in N_+^{(0)}} c[s]B_0[s, M] - c[s_0] \underbrace{B_0[s_0, M]}_{z_0[s]B_1[j_0, M]} - \left(\sum_{s \in N_+^{(0)} \setminus \{s_0\}} c[s]z_0[s] - c[j_0] \right) B_1[j_0, M]}_{u_0[M]} = \\ &= u_0[M] - \left(\sum_{s \in N_+^{(0)}} c[s]z_0[s] - c[j_0] \right) B_1[j_0, M] = \\ &= u_0[M] - \Delta_0[j_0]B_1[j_0, M] \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

БП $x_k \rightarrow \text{БП } x_{k+1}$

Известно: $x_k, N_+^{(k)}, B_k[N_+^{(k)}, M], f(x_k) = \langle c, x_k \rangle, u_k[M]$

При $k = 0$: $f(x_0) = c[N_+^{(0)}] \times x_0[N_+^{(0)}], u_0[M] = c[N_+^{(0)}] \times B_0[N_+^{(0)}, M]$

1.

$$\Delta_k[j] = u_k[M] \times A[M, j] - c[j], \quad j \in N \setminus N_+^{(k)}$$

Если $\Delta_k[j] \leq 0, \quad j \in N \setminus N_+^{(k)}$, то x_k – оптимальный план.

2.

$$\exists j_k \in N \setminus N_+^{(k)} : \quad \Delta_k[j_k] > 0 \Rightarrow z_k[N_+^{(k)}] = B_k[N_+^{(k)}, M] \times A[M, j_k]$$

Если $z_k[N_+^{(k)}] \leq \mathbb{O}[N_+^{(k)}]$, то задача не имеет решения ($\inf = -\infty$).
Иначе

3.

$$t_k = \min \left\{ \frac{x_k[s]}{z_k[s]} \mid s \in N_+^{(k)}, z_k[s] > 0 \right\}$$

s_k – индекс, на котором достигается минимум

4.

$$x_{k+1}[s] = x_k[s] - t_k z_k[s], \quad s \in N_+^{(k)} \setminus \{s_k\}$$

$$x_{k+1}[j_k] = t_k$$

$$N_+^{(k+1)} = N_+^{(k)} \setminus \{s_k\} \cup \{j_k\}$$

5.

$$B_{k+1}[j_k, M] = B_k[s_k, M]/z_k[j_k]$$
$$B_{k+1}[s, M] = B_k[s, M] - z_k[s]B_{k+1}[j_k, M], \quad s \in N_+^{(k)} \setminus \{s_k\}$$

6.

$$f(x_{k+1}) = f(x_k) - t_k \Delta_k[j_k]$$
$$u_{k+1}[M] = u_k[M] - \Delta_k[j_k]B_k[j_k, M]$$

$$x_{k+1}, \quad N_+^{(k+1)}, \quad B_{k+1}[N_+^{(k+1)}, M], \quad f(x_{k+1}), \quad u_{k+1}[M]; \quad f(x_{k+1}) < f(x_k)$$

Базисных планов конечное число.

В среднем шагов столько, сколько ограничений.

1.10 Вычислительная схема симплекс-метода

it = k	$f(x_k)$	$u_k[M]$	$\Delta j_k = \Delta_k[j_k]$
$N_+^{(k)}$	$x_k[N_+^{(k)}]$	$B_k[N_+^{(k)}, M]$	$z_k[N_+^{(k)}]$

Пример 1.10.1

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 4$$

$x_0 = (1, 1, 0, 0)$ – начальный БП

$$\text{Базисная матрица: } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c	it = 0	2	1/3	4/3	$\Delta_4 = 4/3, \Delta_3 = -1 < 0$	A_4
3	1	1	1/3	1/3	1/3	-1
-1	2	1	2/3	-1/3	-4/3	2

it = 1	-2	-1	0	$\Delta_1 = -4 < 0, \Delta_3 = -1 < 0$
4	3	1	1	
2	5	2	1	

Курсивом выделена рабочая строка.

$$x_1[4] = t_0 = 3 = \frac{x_0[1]}{z_0[1]}$$

$$x_1[2] = x_0[2] - t_0 z_0[2]$$

$$f_1 = f_0 - t_0 \Delta_4$$

$$B_1[4, M] = B_0[4, M]/z_0[1]$$

$$B_1[s, M] = B_0[s, M] - z_0[s] \times B_1[4, M]$$

$$u_1[M] = u_0[M] - \Delta_4 \times B_1[4, M]$$

$$f_* = -2$$

Ответ: $x_* = (0, 5, 0, 3)$.

Пример 1.10.2

$$-3x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 9$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 6$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 4$$

Метод искусственного базиса: переходим к вспомогательной задаче

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_6 = 9$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_7 = 6$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 7$$

$$x_5 + x_6 + x_7 \rightarrow \inf$$

Задача гарантированно имеет решение.

$\inf = 0$ – получили решение; $\inf > 0$ – множество планов исходной задачи пусто.

it = 0	15	1	1	1	$\Delta_3 = 4$	A_3
5	0	1	0	0	-1	-1
6	9	0	1	0	3	3
7	6	0	0	1	2	2

0 во втором столбце говорит о вырожденности базисного плана
 $9/3 = 6/2 = 3$ – признак вырожденности БП

it = 1	3	1	-1/3	1	$\Delta_2 = 5/3$	A_2
5	3	1	1/3	0	4/3	2
3	3	0	1/3	0	-2/3	-2
7	0	0	-2/3	1	1/3	-1

it = 2	3	1	3	-4	$\Delta_1 = 3$	A_1
5	3	1	3	-4	3	1
3	3	0	-1	2	0	2
2	0	0	-2	3	-1	1

Опасность зацикливания (значение целевой функции не изменилось)

(*) it = 3	7	2/3	-7	35/3	$\Delta_4 = -37/3 - 21 + 1 < 0$	A_4
1	1	1/3	1	-4/3		1
3	3	0	-1	2		3
2	1	1/3	-1	5/3		-1

(*) означает, что мы перешли к исходной задаче:

во вспомогательной задаче целевая функция стала бы нулем, мы же считаем верхнюю строку так, как это делается на нулевой итерации для исходной задачи.

$$f = \langle c, x \rangle, \quad u = c \times B$$

$$c[N_+] = (-3, 3, 1)$$

Ответ: $x_* = (1, 1, 3, 0)$, $f_* = 7$.

Задачи

23 Решить симплекс-методом:

$$x_1 - 8x_2 - 5x_3 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 = 2$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 3$$

24* Решить симплекс-методом:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \rightarrow \inf$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$$

$$-2x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = -6$$

$$x_1 - x_2 + 6x_3 + x_4 + x_5 = 12$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : 5$$

2 Часть II. Нелинейные экстремальные задачи

2.1 Необходимые условия оптимальности в случае линейных ограничений

$$f(x) \rightarrow \inf \quad (2.1.1)$$

$$A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1]$$

$$A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2]$$

$$x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1]$$

Ω – замкнутое выпуклое, $\Omega^0 \subset \Omega$ – открытое выпуклое
 f дифференцируема на Ω

Определение 2.1.1 f дифференцируема в точке x , если $\exists a \in \mathbb{R}^N$:

$$f(x + h) = f(x) + \langle a, h \rangle + o(\|h\|), \quad \text{тогда } \frac{o(\|h\|)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow \mathbb{O}]{} 0.$$

Если a существует, то он единственный и $a = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x[i]}(x) \right\}_{i \in N}$ – градиент
 f дифференцируема на Ω^0 , если f дифференцируема $\forall x \in \Omega^0$

Пример 2.1.1

$$Q(x) = \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle + \alpha, \quad D = D^T$$

$$Q(x + h) = \frac{1}{2} \langle D(x + h), x + h \rangle + \langle c, x + h \rangle + \alpha = Q(x) + \langle Dx + c, h \rangle + \frac{1}{2} \langle Dh, h \rangle \quad (2.1.2)$$

По неравенству Коши-Буняковского

$$\frac{\langle Dh, h \rangle}{\|h\|} \leq \frac{\|Dh\| \cdot \|h\|}{\|h\|} = \|Dh\| \xrightarrow[h \rightarrow \mathbb{O}]{} 0$$

Вывод: Q дифференцируема на \mathbb{R}^N , $Q'(x) = Dx + c$.

Лемма 2.1.1 Если x_* – решение (2.1.1), то $\forall x \in \Omega$ справедливо неравенство

$$\langle f'(x_*), x - x_* \rangle \geq 0 \quad (2.1.3)$$

Доказательство.

При $x = x_*$ все очевидно.

Пусть $x \neq x_*$.

Ω выпукло $\Rightarrow [x_*, x] \subset \Omega$, т.е. $x_* + t(x - x_*) \in \Omega \forall t \in [0, 1]$.

x_* – точка минимума $\Rightarrow \forall t \in (0, 1) \quad 0 \leq f(x_* + t(x - x_*)) - f(x_*) =$

$$\begin{aligned} &= t \langle f'(x_*), x - x_* \rangle + o(t\|x - x_*\|) \\ t > 0 : \quad &\langle f'(x_*), x - x_* \rangle + \frac{o(t\|x - x_*\|)}{t\|x - x_*\|} \geq 0 \\ t \rightarrow +0 \Rightarrow & (2.1.3) \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Задачи

1 Найти градиент функции

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2,$$

где $A = A[M, N]$ – произвольная матрица.

2* Пусть Q – квадратичная функция и $B = B[N, M]$ – произвольная матрица.

Найти градиент функции $F(y) = Q(x_0 + By)$.

$$\langle f'(x_*), x \rangle \geq \langle f'(x_*), x_* \rangle \quad \forall x \in \Omega$$

x_* — решение задачи ЛП вида

$$\langle f'(x_*), x \rangle \rightarrow \inf_{x \in \Omega}$$

Теорема 2.1.1 $x_* \in \Omega$ — оптимальный план (2.1.1) \Rightarrow

$$\Rightarrow \exists u_* = u_*[M] :$$

$$\begin{aligned} \langle f'(x_*), x_* \rangle &= \langle b, u_* \rangle \\ u_*[M] \times A[M, N_1] &\leq f'(x_*)[N_1] \\ u_*[M] \times A[M, N_2] &= f'(x_*)[N_2] \\ u_*[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned} \tag{2.1.4}$$

Частные случаи:

I. $M_1 = \emptyset, M_2 = M, N_1 = \emptyset, N_2 = N$

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \inf \\ A[M, N] \times x[N] &= b[M] \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

Теорема 2.1.2 [Лагранжа]

x_* — оптимальный план (2.1.5) \Rightarrow

$$\Rightarrow \exists u_* : f'(x_*) = u_* A.$$

Доказательство.

По общей теореме 2.1.1 $\exists u_*$:

$$\langle f'(x_*), x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle, u_* A = f'(x_*).$$

$$\begin{aligned} [\langle f'(x_*), x_* \rangle &= \langle u_* A, x_* \rangle = \langle u_*, Ax_* \rangle = \\ &= \langle u_*, b \rangle \text{ — первое условие избыточно.}] \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

II. $N_1 = \emptyset, N_2 = N$.

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \inf & (2.1.6) \\ A[M_1, N] \times x[N] &\geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] &= b[M_2] \end{aligned}$$

Теорема 2.1.3 [Куна-Таккера] x_* — оптимальный план (2.1.6) $\Rightarrow \exists u_* :$
 $f'(x_*) = u_* A$

$$\begin{aligned} (A[i, N] \times x_*[N] - b[i]) \times u_*[i] &= 0, \quad i \in M_1, & (2.1.7) \\ u_*[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned}$$

[(2.1.7) — условие дополнительности.]

Доказательство.

По общей теореме

$$\begin{aligned} u_* A &= f'(x_*), \quad \langle f'(x_*), x_* \rangle = \langle b, u_* \rangle \\ u[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Рассмотрим } 0 &= \langle f'(x_*), x_* \rangle - \langle b, u_* \rangle = \\ &= \langle u_* A, x_* \rangle - \langle u_*, b \rangle = \langle u_*, Ax_* - b \rangle \end{aligned}$$

$$\sum_{i \in M_1} \underbrace{(A[i, N] \times x_*[N] - b[i])}_{\geq 0} \times \underbrace{u_*[i]}_{\geq 0} = 0 \Rightarrow (2.1.7)$$

Что и требовалось доказать.

Замечание 2.1.1 В формулировке теоремы 2.1.3 условие (2.1.7) можно заменить равносильным $\langle Ax_* - b, u_* \rangle = 0$

2.2 Критерий оптимальности для выпуклой целевой функции и линейных ограничений

Ω^0 — выпуклое открытое множество.

f выпукла на Ω^0 , если $\forall x_0, x_1 \in \Omega^0 \quad \forall t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} f(tx_1 + (1-t)x_0) &\leq tf(x_1) + (1-t)f(x_0) \\ (1')f(x_0 + t(x_1 - x_0)) &\leq f(x_0) + t(f(x_1) - f(x_0)) \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

Лемма 2.2.1 (Критерий выпуклости дифференцируемой функции)

Пусть f дифференцируема на Ω^0 . f выпукла на $\Omega^0 \Leftrightarrow \forall x_0, x_1 \in \Omega^0 :$

$$f(x_1) - f(x_0) \geq \langle f'(x_0), x_1 - x_0 \rangle \quad (2.2.2)$$

Доказательство.

$\Rightarrow:$

$$\begin{aligned} (1') \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_0) &\geq \frac{1}{t}[f(x_0 + t(x_1 - x_0)) - f(x_0)] = \\ &= \langle f'(x_0), x_1 - x_0 \rangle + \frac{o(\|t(x_1 - x_0)\|)}{t\|x_1 - x_0\|} \|x_1 - x_0\| \end{aligned}$$

$t > 0$, переходим к пределу $\lim_{t \rightarrow +0} \rightarrow (2.2.2)$.

Мы доказали (2.2.2) при $x_1 \neq x_0$. При $x_1 = x_0$ (2.2.2) тривиально.

$\Leftarrow:$ Фиксируем разные x_0, x_1 из Ω^0 , фиксируем $t \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned} x(t) &:= tx_1 + (1-t)x_0 \in \Omega^0 \\ (2.2.2) : f(x_1) - f(x(t)) &\geq \langle f'(x(t)), x_1 - x(t) \rangle \quad | \times t \\ + f(x_0) - f(x(t)) &\geq \langle f'(x(t)), x_0 - x(t) \rangle \quad | \times (1-t) \\ tf(x_1) + (1-t)f(x_0) - f(x(t)) &\geq \langle f'(x(t)), \underbrace{tx_1 + (1-t)x_0 - x(t)}_{=0} \rangle = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow (2.2.1) \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

<-!-РИСУНОК-!->

Лемма 2.2.2 Квадратичная функция $Q(x) = \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle + \alpha$, $D^T = D$, является выпуклой на $\mathbb{R}^N \Leftrightarrow D$ неотрицательно определена, т. е. $\langle Dh, h \rangle \geq 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^N$.

Доказательство.

$$\forall x_1, x_0 \in \mathbb{R}^N \quad Q(x_1) - Q(x_0) - \langle Q'(x_0), x_1 - x_0 \rangle = \frac{1}{2} \langle D(x_1 - x_0), x_1 - x_0 \rangle$$

(по (2.1.2) из §1.)

Если Q выпукла, то $\langle D(x_1 - x_0), x_1 - x_0 \rangle \geq 0$,

Если D неотрицательно определена, то $\langle D(x_1 - x_0), x_1 - x_0 \rangle \geq 0 \Rightarrow Q$ выпукла по критерию.

Что и требовалось доказать.

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \inf & (2.2.3) \\ A[M_1, N \times x[N] &\geq b[M_1] \\ A[M_2, N \times x[N] &\geq b[M_2] \\ x[N_1] &\geq \mathbb{O}[N_1] \end{aligned}$$

Предположим, что f выпукла и дифференцируема.

Теорема 2.2.1 x_* — оптимальный план задачи (2.2.3) \Leftrightarrow

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \exists u_* = u_*[M] : \langle f'(x_*), x_* \rangle &= \langle b, u_* \rangle, u_*[M] \times A[M, N_1] \leq f'(x_*)[N_1] \\ u_*[M] \times A[M, N_2] &= f'(x_*)[N_2] \\ u_*[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned}$$

Доказательство.

\Rightarrow : Доказано в §1.

\Leftarrow :

$$(!) \quad f(x) - f(x_*) \geq 0$$

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_*) &\stackrel{(2.2.2)}{\geq} \langle f'(x_*), (x - x_*) \rangle = \langle f'(x_*), x \rangle - \\ &- \langle f'(x_*), x_* \rangle \stackrel{N=N_1 \cup N_2}{\geq} \langle u_* A, x \rangle - \langle b, u_* \rangle = \\ &= \langle u_*, Ax - b \rangle \stackrel{M=M_1 \cup M_2}{\geq} 0 \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Частные случаи: I.

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \inf & (2.2.4) \\ A[M, N] \times x[N] &= b[M] \end{aligned}$$

Теорема 2.2.2 x_* — оптимальный план (2.2.4) с выпуклой дифференцируемой $f \Leftrightarrow \exists u_* : f'(x_*) = u_* A$.

Доказательство.

\Rightarrow : Доказано в §1.

\Leftarrow :

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_*) &\stackrel{(2.2.2)}{\geq} \langle f'(x_*), x - x_* \rangle = \\ &\langle u_* A, x - x_* \rangle = \underbrace{\langle u_*, (Ax - b) \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle u_*, (b - Ax_*) \rangle}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

II.

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \inf & (2.2.5) \\ A[M_1, N] \times x[N] &\geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] &\geq b[M_2] \end{aligned}$$

Теорема 2.2.3 x_* — оптимальный план (2.2.5) с выпуклой дифференцируемой функцией $f \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \exists u_* = u_*[M] : f'(x_*) = u_* A, \\ &(A[i, M] \times x_*[N] - b[i]) u_*[i] = 0, \quad i \in M_1, \\ &u_*[M_1] \geq \mathbb{O}[M_1]. \end{aligned}$$

Доказательство.

\Rightarrow : Доказано в §1.

\Leftarrow :

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_*) &\geq \langle f'(x_*), x - x_* \rangle = \\ &= \langle u_*, (Ax - b) + \underbrace{(b - Ax_*)}_{=0 \text{ из усл. доп-сти.}} \rangle = \langle u_*, Ax - b \rangle \stackrel{M=M_1 \cup M_2}{\geq} 0 \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Задачи

3 Пусть D — симметричная неотрицательно определенная матрица. Доказать, что из $\langle Dx_0, x_0 \rangle = 0$ следует $Dx_0 = \mathbb{O}$

4* Доказать, что квадр. функция $Q(x)$, ограниченная снизу на \mathbb{R}^N , является выпуклой на \mathbb{R}^N .

5* Доказать, что дифференцируемая на выпуклом открытом множестве Ω^0 функция $f(x)$ выпукла на $\Omega^0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \langle f'(x_1) - f'(x_0), x_1 - x_0 \rangle \geq 0 \quad \forall x_0, x_1 \in \Omega^0$$

Пример 2.2.1 (Проектирование точки на подпространство) Пусть $A = A[M, N]$ — матрица с ЛНЗ строками, $c \in \mathbb{R}^N$ — фиксирована.

$$\begin{aligned} \|x - c\| &\rightarrow \inf \\ A[M, N] \times x[N] &= \mathbb{O}[M] \end{aligned}$$

[Здесь $\|\cdot\|$ — евклидова норма.]

<-!-РИСУНОК-!->

Эквивалентная задача: [не в смысле определения 0.0.1, а из-за равенства точки минимума.]

$$Q(x) = \frac{1}{2} \|x - c\|^2 \rightarrow \inf$$

$$Ax = \mathbb{O}$$

$$\frac{1}{2} \|x - c\|^2 = \frac{1}{2} \langle x - c, x - c \rangle = \frac{1}{2} \langle Ex, x \rangle - \langle c, x \rangle + \frac{1}{2} \|c\|^2$$

$Q(x)$ — квадр. функция с неотрицательно определенной матрицей $E \Rightarrow Q$ выпукла на \mathbb{R}^N , $Q'(x) = x - c$

Критерий оптимальности:

$$\begin{cases} x - c = uA \\ Ax = \mathbb{O} \end{cases}$$

$$\underbrace{Ax}_{=\mathbb{O}} - Ac = AA^T u \Rightarrow (AA^T)u = -Ac$$

$$uA = A^T u; \quad | \times A \text{ слева}$$

Обратима ли AA^T ?

Рассмотрим ОСЛУ $(AA^T)v = 0$. Пусть v_0 — решение \Rightarrow

$$0 = \langle AA^T v_0, v_0 \rangle = \langle A^T v_0, A^T v_0 \rangle = \|A^T v_0\|^2 \Rightarrow A^T v_0 = \mathbb{O}$$

Линейная комбинация столбцов A^T (строк A) дает \mathbb{O} . Значит, $v_0 = \mathbb{O}$; AA^T — невырожденная матрица.

$$\exists (AA^T)^{-1}; \quad u_* = -(AA^T)^{-1}Ac$$

$$x_* = c + A^T u_* = c - A^T (AA^T)^{-1}Ac = (E - A^T (AA^T)^{-1}A)c =: P c$$

$$P = E - A^T (AA^T)^{-1}A \text{ — матрица ортогонального проектирования}$$

Лемма 2.2.3 (свойства матрицы P).

1. $PA^T = \mathbb{O}, \quad PP = P$.
2. P симметрична, неотрицательно определена.
3. $\operatorname{rank} P = |N| - |M|$.

Доказательство.

1.

$$PA^T = EA^T - A^T (AA^T)^{-1}AA^T = \mathbb{O}$$

$$PP = PE - PA^T (AA^T)^{-1}A = PE - \mathbb{O}(\underbrace{AA^T}_{\text{СИММ.}})^{-1}A = P$$

2.

$$P^T = (E - A^T(AA^T)^{-1}A)^T = E^T - A^T[(AA^T)^{-1}](A^T)^T = P$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^N \quad \langle Px, x \rangle = \langle PPx, x \rangle = \langle Px, Px \rangle \geq 0$$

3. Рассмотрим однородную систему уравнений

$$Px = \mathbb{O} \quad (2.2.6)$$

$PA^T = \mathbb{O} \Rightarrow \exists$ как минимум $|M|$ лин. независимых решений (2.2.6)
(строки матрицы A)

Пусть x_0 – другое решение (2.2.6).

$\mathbb{O} = Px_0 = x_0 - A^T(AA^T)^{-1}Ax_0 = x_0 - A^Tv \Rightarrow x_0 = A^Tv$ – линейная комбинация строк A

$$\dim \{x \mid Px = \mathbb{O}\} = |M|$$

По теореме из алгебры $\dim \{x \mid Px = \mathbb{O}\} = |N| - \text{rank } P$.

Что и требовалось доказать.

Пример 2.2.2 Проектирование точки на стандартный симплекс

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\frac{1}{2} \|x - c\|^2 \rightarrow \inf$$

$$\sum_{j=1}^n x_j = 1$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in 1 : n$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \lambda \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{array} \right. \quad (n+1) \text{ строки, } n \text{ столбцов}$$

Критерий оптимальности:

$$x_j - c_j = \lambda + u_j, \quad j \in 1 : n$$

$$x_j u_j = 0, \quad j \in 1 : n$$

$$u_j \geq 0, \quad j \in 1 : n$$

$$\lambda + c_j = x_j - u_j$$

$$|\lambda + c_j| = |x_j - u_j| = x_j + u_j,$$

так как либо $x_j = 0, u_j \geq 0$, либо $x_j \geq 0, u_j = 0$

$$x_j = \frac{\lambda + c_j + |\lambda + c_j|}{2}$$

Обозначим $t_+ = \frac{t+|t|}{2}$; $x_j = (\lambda + c_j)_+$, $j \in 1 : n$

$$\sum_{j=1}^n x_j = 1$$

$$\varphi(\lambda) = \sum_{j=1}^n (\lambda + c_j)_+ = 1$$

Переупорядочим последовательность $\{-c_j\}$ по неубыванию;
получим последовательность $\{a_j\}$: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$

$$\varphi(\lambda) = \sum_{j=1}^n (\lambda - a_j)_+$$

$\varphi(\lambda)$ – непрерывная выпуклая ломаная, монотонно возрастает при $\lambda \geq a_1$
от 0 до $+\infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi(\lambda) = 1$ имеет единственное решение λ_*

$$\lambda \leq a_1 : \quad \varphi(\lambda) = 0$$

$$\lambda \in [a_k, a_{k+1}] : \quad \varphi(\lambda) = \sum_{j=1}^k (\lambda - a_j) = k\lambda - s_k, \quad s_k = \sum_{j=1}^k a_j$$

$$\lambda \geq a_n : \quad \varphi(\lambda) = n\lambda - s_n$$

$$\varphi_k := \varphi(a_k), \quad k \in 1 : n; \quad \varphi_k = ka_k - s_k$$

$$\lambda \in [a_k, a_{k+1}] : \quad \varphi(\lambda) = \varphi_k + k(\lambda - a_k)$$

$$\lambda \geq a_n : \quad \varphi(\lambda) = \varphi_n + n(\lambda - a_n)$$

$$\varphi_1 = 0; \quad \varphi_{k+1} = \varphi_k + k(a_{k+1} - a_k), \quad k \in 1 : n - 1 \quad (2.2.7)$$

Как искать λ_* ? Если $\varphi_k < 1 \leq \varphi_{k+1}$ при некотором k , то

$$\lambda_* = a_k + \frac{1 - \varphi_k}{k} \quad (2.2.8)$$

Если $\varphi_n < 1$, то

$$\lambda_* = a_n + \frac{1 - \varphi_n}{n} \quad (2.2.9)$$

Окончательно:

$$x_j^* = (\lambda_* + c_j)_+ \quad (2.2.10)$$

Алгоритм:

1. Переупорядочиваем $\{-c_j\} \rightarrow \{a_j\}$: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.
2. Последовательно вычисляем $\varphi_2, \varphi_3, \dots$ по (2.2.7) до тех пор, пока не $\varphi_k < 1 \leq \varphi_{k+1}$, и вычисляем λ_* по формуле (2.2.8).
3. Если $\varphi_n < 1$, то вычисляем λ_* по формуле (2.2.9).
4. Вычисляем x_j^* по формуле (2.2.10).

Пример:

$$c = (1, -1, 0, 1, 0, -2)$$

k	1	2	3	4	5	6
a_k	-1	-2	0	0	1	2

$$\varphi_1 = 0; \quad \varphi_2 = 0 + 1 \cdot 0 = 0; \quad \varphi_3 = 0 + 2[0 - (-1)] = 2$$

$$\lambda_* = -\frac{1}{2}$$

$$x_j^* = (c_j - \frac{1}{2})_+$$

Ответ: $x^* = (\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0)$.

Задачи

6* Найти все собственные числа матрицы ортогонального проектирования.

7 Укажите матрицу ортогонального проектирования на подпространство

$$x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0.$$

8 Найти проекцию точки $c = (0, -1, -\frac{1}{4}, 0, 0, -\frac{1}{4})$ на стандартный симплекс.

9* Решить экстремальную задачу

$$\frac{1}{2} \|x\|^2 \rightarrow \inf$$

$$Ax = b$$

где $A = A[M, N]$ – матрица с линейно независимыми строками.

10 Решить экстремальную задачу

$$\frac{1}{2} \|x - c\|^2 \rightarrow \inf$$

$$x \geq 0$$

2.3 Квадратичное программирование

$$Q(x) := \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle \rightarrow \inf \quad (2.3.1)$$

$$\Omega \begin{cases} A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2] \\ x[N_1] \geq \mathbb{O}[N_1] \end{cases}$$

D симметрична, неотрицательно определена ($\Rightarrow Q$ выпукла)

Теорема 2.3.1 (теорема существования).

Задача (2.3.1) имеет решение $\iff \Omega \neq \emptyset \text{ и } \inf_{x \in \Omega} Q(x) > -\infty$.

Лемма 2.3.1 Линейная система $Ax = b$ совместна \iff любое решение v однородной системы $vA = \mathbb{O}$ ортогонально b , т.е. $\langle b, v \rangle = 0$.

Без доказательства (факт из алгебры).

$$Q(x) := \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle \rightarrow \inf \quad (2.3.2)$$

$$\omega : A[M, N] \times x[N] = b[M]$$

По теореме Лагранжа 2.1.2

$$x_* - \text{оптимальный план} \iff \exists u_* \quad Dx_* + c = A^T u_*$$

Лемма 2.3.2 Задача (2.3.2) имеет решение, если $\omega \neq \emptyset$ и $\inf_{x \in \omega} Q(x) > -\infty$.

Доказательство.

От противного. Пусть решения нет.

$$\begin{aligned} \text{Тогда несовместна система } & \begin{cases} Dx - A^T u = -c \\ -Ax = -b \end{cases} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \exists v = v[N] \text{ и } \lambda = \lambda[M] : \\ & vD - \lambda A = \mathbb{O}, \quad Av = \mathbb{O} \\ & \langle c, v \rangle + \langle b, \lambda \rangle \neq 0 \end{aligned} \quad (2.3.3)$$

Зафиксируем $x_0 \in \omega$.

Рассмотрим $x_t = x_0 + tv$. $x_t \in \omega \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} Q(x_t) - Q(x_0) &= t \langle Dx_0 + c, v \rangle + \frac{1}{2} t^2 \langle Dv, v \rangle = t \langle Dx_0, v \rangle + t \langle c, v \rangle + \frac{1}{2} t^2 \langle \lambda A, v \rangle = \\ &= t \langle c, v \rangle + t \langle x_0, Dv \rangle + \frac{1}{2} t^2 \langle \lambda, Av \rangle = t \langle c, v \rangle + t \langle x_0, \lambda A \rangle = \\ &= t(\langle c, v \rangle + \langle Ax_0, \lambda \rangle) = t(\langle c, v \rangle + \langle b, \lambda \rangle) \end{aligned}$$

Значит, Q не ограничена снизу на ω . Противоречие. (2.3.2) имеет решение.

Что и требовалось доказать.

$$Q(x) = \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle \rightarrow \inf \quad (2.3.4)$$

$$\Omega \begin{cases} A[M_1, N] \times x[N] \geq b[M_1] \\ A[M_2, N] \times x[N] = b[M_2] \\ x[N_1] \geq \mathbb{O}[N] \end{cases}$$

Здесь $D = D^T$, неотрицательно определена.

Теорема 2.3.2 Задача (2.3.4) имеет решение $\Leftrightarrow \Omega \neq \emptyset$ и $Q(x)$ ограничена снизу на Ω .

Доказательство.

$$\begin{aligned} & \hat{A}[T, N] \times x[N] \geq \hat{b}[T], \text{ где} \\ & \hat{A} = \begin{pmatrix} A[M_1, N] \\ A[M_2, N] \\ -A[M_2, N] \\ E[N_1, N] \end{pmatrix} \quad \hat{b} = \begin{pmatrix} b[M_1] \\ b[M_2] \\ -b[M_2] \\ \mathbb{O}[N_1] \end{pmatrix} \\ & \Delta(x)[T] = \hat{A}[T, N] \times x[N] - \hat{b}[T] \end{aligned}$$

Для $\gamma \subset T$:

$$\Omega(\gamma) = \left\{ x \in \mathbb{R}^N : \begin{array}{l} \Delta(x)[\gamma] = \mathbb{O}[\gamma] \\ \Delta(x)[T \setminus \gamma] > \mathbb{O}[T \setminus \gamma] \end{array} \right\}$$

— грань (случай $\gamma = \emptyset$ не исключается).

$$\Gamma = \{ \gamma \subset T : \Omega(\gamma) \neq \emptyset \}$$

$$\Omega(\gamma) \subset \Omega \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

$$\Omega(\gamma) \cap \Omega(\gamma') = \emptyset \quad \text{при} \quad \gamma \neq \gamma'$$

$$\Omega = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \Omega(\gamma) \Rightarrow$$

$$\alpha := \inf_{x \in \Omega} Q(x) = \min_{\gamma \in \Gamma} \inf_{x \in \Omega} (\gamma) Q(x) \quad (2.3.5)$$

γ_* — множество, на котором достигается \min в (2.3.5) с наибольшим количеством элементов.

$$\inf_{x \in \Omega(\gamma_*)} Q(x) = \alpha \quad (2.3.6)$$

Обозначим $\partial\Omega(\gamma_*) = \bigcup_{\substack{\gamma \supset \gamma_* \\ \gamma \neq \gamma_*}} \Omega(\gamma)$ — относительная граница грани.

I. Пусть $\partial\Omega(\gamma_*) \neq \emptyset$

$$\alpha := \inf_{x \in \partial\Omega(\gamma_*)} Q(x) > \alpha \quad (2.3.7)$$

В частности,

$$\exists x_0 \in \Omega(\gamma_*) : Q(x_0) < \alpha' \quad (2.3.8)$$

Введем множество $\omega_* = \{x \in \mathbb{R}^N : \Delta(x)[\gamma_*] = \mathbb{O}\}$ ω_* — аффинная оболочка грани $\Omega(\omega_*)$

Покажем, что

$$Q(x) > \alpha' \quad \forall x \in \omega_* \setminus \Omega \quad (2.3.9)$$

Фиксируем $x_1 \in \omega_* \setminus \Omega \Rightarrow \Delta(x)[i] < 0$ при некоторых $i \in T$

$$x_t = x_0 + t(x_1 - x_0)$$

$$\exists t : x_t \in \partial\Omega(\gamma_*) \quad ?$$

$$\Delta(x_t) = \Delta(x_0) + t(\Delta(x_1) - \Delta(x_0))$$

Положим

$$\begin{aligned} t &= \min_{\{i \in T \setminus \gamma_* : \Delta(x_1)[i] < 0\}} \frac{\Delta(x_0)[i]}{\Delta(x_0)[i] - \Delta(x_1)[i]} \\ t &\in (0; 1), \quad \Delta(x_t)[i_0] = 0, \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

где i_0 — индекс, на котором достигается минимум в (2.3.10)

В целом: $\Delta(x_0) \geq \mathbb{O}$

$$x_t \in \omega_* \Rightarrow x_t \in \partial\Omega(\gamma_*)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{определение } \alpha' \\ \text{выпуклость } Q \\ \text{неравенство (2.3.8)} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha' &\leq Q(x_t) \leq tQ(x_1) + (1-t)Q(x_0) < tQ(x_1) + (1-t)\alpha' \\ \Rightarrow Q(x_1) &> \alpha' \Rightarrow (2.3.9) \end{aligned}$$

$$\omega_* = (\omega_* \setminus \Omega) \cup (\omega_* \cap \Omega) = (\omega_* \setminus \Omega) \cup \Omega(\gamma_*) \cup \partial\Omega(\gamma_*)$$

сл., по (2.3.6), (2.3.7), (2.3.9) \Rightarrow

$$\inf_{x \in \omega_*} Q(x) = \alpha \quad (2.3.11)$$

По лемме 2.3.2 \inf в (2.3.11) достигается, т. е. $\exists x_* \in \omega_* : Q(x_*) = \alpha$. В силу (2.3.7) и (2.3.9) $x_* \in \Omega(\gamma_*) \subset \Omega$. В случае $\partial\Omega(\gamma_*) \neq \emptyset$ теорема доказана.

II. Пусть $\partial\Omega(\gamma_*) = \emptyset$. Нетрудно показать, что

$$\omega_* = \Omega(\gamma_*)$$

\Rightarrow из (2.3.6) и леммы 2.3.2 следует разрешимость задачи (2.3.4)

Что и требовалось доказать.

Теорема 2.3.3 (*критерий оптимальности*)
 $x_* \in \Omega$ — оптимальный план (2.3.4) $\Leftrightarrow \exists u_* = u_*[M]$

$$\begin{aligned} \langle b, u_* \rangle &= \langle Dx_* + c, x_* \rangle \\ -x_*[N] \times D[N, N_1] + u_*[M] \times A[M, N_1] &\leq c[N_1] \\ -x_*[N] \times D[N, N_2] + u_*[M] \times A[M, N_2] &= c[N_2] \\ u_*[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

Доказательство.

Переформулировка общей теоремы 2.1.1.

$$Q'(x_*) = Dx_* + c, \quad D = D^T$$

Что и требовалось доказать.

Перепишем (2.3.12):

$$\underbrace{\frac{1}{2} \langle Dx_*, x_* \rangle + \langle c, x_* \rangle}_{Q(x_*)} = -\underbrace{\frac{1}{2} \langle Dx_*, x_* \rangle + \langle b, u_* \rangle}_{q(x_*, u_*)}$$

Введем G — множество пар $z = \{v, u\}$:

$$\begin{aligned} -v[N] \times D[N, N_1] + u[M] \times A[M, N_1] &\leq c[N_1] \\ -v[N] \times D[N, N_2] + u[M] \times A[M, N_2] &= c[N_2] \\ u[M_1] &\geq \mathbb{O}[M_1] \end{aligned}$$

Критерий оптимальности:

$x_* \in \Omega$ — оптимален $\Leftrightarrow \exists u_* : z_* := \{x_*, u_*\} \in G$ и $Q(x_*) = q(z_*)$.

Лемма 2.3.3

$$\forall x \in \Omega, \forall z \in G$$

$$Q(x) \geq q(z)$$

$$q(z) = -\frac{1}{2} \langle Dv, v \rangle + \langle b, u \rangle$$

Доказательство.

$$\langle b, u \rangle \stackrel{M=M_1 \cup M_2}{\leq} \langle Ax, u \rangle = \langle uA, x \rangle \stackrel{N=N_1 \cup N_2}{\leq} \langle Dv + c, x \rangle = \langle c, x \rangle + \langle Dv, x \rangle \quad (2.3.13)$$

D — неотрицательно определена \Rightarrow

$$0 \leq \frac{1}{2} \langle D(v - x), v - x \rangle = \frac{1}{2} \langle Dv, v \rangle + \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle - \langle Dv, x \rangle$$

Подставим в (2.3.13) — получаем требуемое.

Что и требовалось доказать.

x_* — оптимальный план $\Rightarrow \exists u_* : z_* = \{x_*, u_*\} \in G$ и $Q(x_*) = q(z_*)$

По лемме 2.3.3 $\forall z \in G \quad q(z) \leq Q(x_*) = q(z_*)$ — значит, что z_* — решение экстремальной задачи.

$$q(z) \rightarrow \sup_{z \in G} \quad (2.3.14)$$

(2.3.14) наз. *двойственной* к (2.3.4)

$$\min_{x \in \Omega} Q(x) = \max_{z \in G} q(z) \quad (2.3.15)$$

Можно показать, что (2.3.14) \Rightarrow (2.3.4).

Теорема 2.3.4 (1-я теорема двойственности)

Если одна из пары двойственных задач (2.3.4), (2.3.14) имеет решение, то имеет решение и вторая, при этом выполнено (2.3.15). Как и в линейном случае, можно доказать критерий совместной разрешимости и вторую теорему двойственности.

Задачи

11* Решить экстремальную задачу:

$$\frac{1}{2} \|x - c\|^2 \rightarrow \inf$$

$$|x_j| \leq 1 \quad \forall j \in 1 : n$$

12 Доказать, что проекция точки c на произвольное замкнутое выпуклое множество $\omega \in \mathbb{R}^n$ существует и единственна.

13* Пусть P — матрица ортогонального проектирования. Доказать, что $\|Pc\| \leq \|c\|$, равенство достигается $\Leftrightarrow Ac = 0$

14 Пусть $D : D = D^T$, положительно определена. Доказать, что

$$\min_{x \in \mathbb{R}^N} \left\{ \frac{1}{2} \langle Dx, x \rangle + \langle c, x \rangle \right\} = \frac{1}{2} \langle D^{-1}c, c \rangle$$

15* Решить экстремальную задачу.

$$F(x, \underbrace{v}_{\text{число}}) := \frac{1}{2} \|x\|^2 + v \rightarrow \inf$$

$$\langle a, x \rangle \leq v$$

2.4 Основная лемма нелинейного программирования

$$a_i(x) = 0, \quad i \in I \quad (2.4.1)$$

Пусть $x_0 \in \mathbb{R}^n$ удовлетворяет системе (2.4.1)

Лемма 2.4.1 (*основная нелинейного программирования*)

Пусть функции $a_i, i \in I$, непрерывно дифференцируемы в окрестности x_0 и $a'_i(x_0), i \in I$ — линейно независимы. (Условие регулярности). Тогда $\forall g_0 \neq \mathbb{O} : \langle g_0, a'_i(x_0) \rangle = 0, i \in I \quad \exists x = x(t) — кривая, непрерывно дифференцируемая в окрестности точки $t = 0$ и удовлетворяющая:$

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0 \\ x'(0) &= g_0 \\ a_i(x(t)) &= 0, \quad t \in (-\delta, \delta), \quad \forall i \in I \end{aligned} \quad (2.4.2)$$

<-!-РИСУНОК-!->

Доказательство.

Анализ: пусть $x(t)$ существует.

$$A(x) = \{a_i(x)\}_i \in I$$

$$A'(x) = \{a'_i(x)\}_i \in I — матрица Якоби$$

По цепному правилу:

$$[a_i(x(t))]' = \langle a'_i(x(t)), x'(t) \rangle$$

Для матрицы:

$$[A(x(t))]' = A'(x(t))x'(t) \quad (2.4.3)$$

$$(2.4.2) : \left. \begin{aligned} [a_i(x(t))]' &= 0 \\ x(0) &= x_0 \end{aligned} \right\} t \in (-\delta, \delta) \quad (3')$$

(3') \Rightarrow (2.4.2) ?

По теореме о среднем

$$a_i(x(t)) = a_i(x(0)) + \underbrace{\langle a'_i(x(\tau_i)), x'(\tau_i) \rangle}_{=0 \text{ по } (3')} > t$$

τ — какая-то средняя точка $(0; t)$ при $t \in (-\delta, \delta)$

$$x(0) = x_0, \quad a(x_0) = 0$$

сл. $a_i(x(t)) = 0$ при $t \in (-\delta, \delta)$

сл. (3') \Rightarrow (2.4.2)

$$A'(x_0)g_0 = \mathbb{O}$$

$a'_i(x)$ — линейно независимы $\Rightarrow rank A'(x_0) = |I|$

$\Rightarrow \exists J \subset N : |J| = |I|, A'(x_0)[I, J]$ — квадратная, неособая

$$\begin{aligned} A'(x_0)[I, J] \times g_0[J] + A'(x_0)[I, N \subset J] \times g_0[N \subset J] &= \mathbb{O} \\ \Rightarrow g_0[J] &= -(A'(x_0)[I, J])^{-1} \times A'(x_0)[I, N \setminus J] \times g_0[N \setminus J] \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

$$\begin{aligned} (3') &= A'(x)[I, J] \times x'[J] + A'(x)[I, N \setminus J] \times x'[N \setminus J] = \mathbb{O}[I] \\ x'(t)[N \setminus J] &= g[N \setminus J] \\ \left\{ \begin{array}{l} x'(t)[J] = -(A'(x)[I, J])^{-1} A'(x)[I, N \setminus J] \times g_0[N \setminus J] \\ x(0) = x_0 \end{array} \right. \end{aligned} \quad (2.4.5)$$

Правая часть непрерывна в окрестности начального приближения $(0, x_0)$. При $x = x_0$ матрица $A'(x_0)[I, J]$ — обратима $\Rightarrow \det(A'(x)[I, J])$ — отличен от нуля в окрестности точки x_0 . Сл., $(A'(x)[I, J])^{-1}$ непрерывна в окрестности точки x_0 . По теореме Пеано (2.4.5) имеет решение в окрестности точки $t = 0$. Покажем, что это требуемая кривая.

$(2.4.5) \Rightarrow (3')$ (вместо $g_0[N \setminus J]$ подставим $x'(t)[N \setminus J]$).

$$x'(0) = g_0(?)$$

В (2.4.5) подставим $t = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} x'(0)[N \setminus J] = g_0[N \setminus J] \\ x'(0)[J] = g_0[J] \end{array} \right\} \Rightarrow x'(0) = g_0$$

Что и требовалось доказать.

2.5 Теорема Куна-Таккера в дифференциальной форме

$$f(x) \rightarrow \inf \quad (2.5.1)$$

$$\Omega \left\{ \begin{array}{l} a_i(x) \geq 0, \quad i \in M_1 \\ a_i(x) = 0, \quad i \in M_2 \\ x \in U \subset \mathbb{R}^N \end{array} \right.$$

U — открытое множество. $f, a_i \in C^{(1)}(U)$

$$x \in \Omega : M_1(x) = \{i \in M_1 | a_i(x) = 0\}$$

$I(x) = M_1(x) \cup M_2$ — множество индексов активных ограничений.

<-!-РИСУНОК-!->

$$a_i(x) > 0, \quad i \in M \setminus I(x) = M_1 \setminus M_1(x)$$

Определение 2.5.1 $x_* \in \Omega$ наз. точкой локального минимума.

$$\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x_*) \quad \forall x \in \Omega \cap U_\delta(x_*)$$

$$U_\delta(x_*) = \{x : \|x - x_*\| < \delta\}$$

Теорема 2.5.1 (Куна - Таккера) $x_* \in \Omega$ — точка локального минимума в задаче (2.5.1) и ограничения в ней регулярны. ($a'_i(x_*)$ ЛНЗ при $i \in I(x_*)$).

$$\Rightarrow \exists u_* = u_*[I(x_*)]$$

$$f'(x_*) = \sum_{i \in I(x_*)} u_*[i] a'_i(x_*) \quad (2.5.2)$$

$$u_*[i] \geq 0, \quad i \in M_1(x_*) \quad (2.5.3)$$

Доказательство.

$M_1(x_*) \neq \emptyset$ (иначе только проще).

От противного:

(2.5.2), (2.5.3) — линейная система относительно u_* . Если она не совместна, то $\exists g_0$:

$$\begin{aligned} \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle &\geq 0, \quad i \in M_1(x_*) \\ \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle &= 0, \quad i \in M_2 \\ \langle f'(x_*), g_0 \rangle &< 0 \end{aligned} \quad (2.5.4)$$

$$g_0 \curvearrowright -u_0$$

$$I_0(x_*) = \{i \in I(x_*) : \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle = 0\}$$

$$M_2 \subset I_0(x_*) \subset I(x_*)$$

$$\Rightarrow \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle > 0 \text{ при } i \in I(x_*) \setminus I_0(x_*) \quad (2.5.5)$$

$$a_i(x) = 0, i \in I_0(x_*) \quad (2.5.6)$$

x_* удовлетворяет (2.5.6), $a_i(x)$ непрерывно дифференцируема в окрестности x_* .

$$a'_i(x_*) \quad i \in I_0(x_0), \text{ ЛНЗ } [I_0(x_*) \subset I_0(x_0)]$$

$$\langle a'_i(x_*), g_0 \rangle = 0, \quad i \in I_0(x_*) \quad [q_0 \neq \mathbb{O} \text{ в силу (2.5.4)}]$$

По основной лемме нелинейного программирования $x = x(t)$, гладкая в окрестности $t = 0$.

$$x(0) = x_*, \quad x'(0) = g_0, \quad a_i(x(t)) = 0, \quad i \in I_0(x_*), t \in (-\delta, \delta)$$

$$x(t) \in \Omega \text{ при малых } t > 0 (?)$$

На $I_0(x_*)$ определение выполнено как равенство. $i \in I(x)$.

$i \in I_0(x_*)$ – ограничения выполнены как равенства
 $i \in I(x_*) \setminus I_0(x_*)$:

$$\begin{aligned} a_i(x(t)) &= a_i(x(0)) + \langle a'_i(x(0)), x'(0) \rangle t + o(t) = \\ &= \underbrace{a_i(x_*)}_{=0} + \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle t + o(t) = \langle a'_i(x_*), g_0 \rangle t + o(t) = \\ &= t \left[\underbrace{\langle a'_i(x_*), g_0 \rangle}_{>0 \text{ по (2.5.5)}} + \frac{o(t)}{t} \right] > 0 \text{ при малых } t > 0 \end{aligned}$$

$i \in M \setminus I(x_*)$:

$$\underbrace{a_i(x_*)}_{x(0)=x_*} > 0 \Rightarrow a_i(x(t)) > 0$$

Итак, $x(t) \in \Omega$ при малых $t > 0$.

$$\begin{aligned} f(x(t)) &= f(\underbrace{x(0)}_{=x_*}) + \langle f'(x(0)), \underbrace{x'(0)}_{=g_0} \rangle + o(t) = \\ &= f(x_*) + t \left[\underbrace{\langle f'(x_*), g_0 \rangle}_{<0 \text{ по (2.5.4)}} + \frac{o(t)}{t} \right] < f(x_*) \text{ при малых } t > 0 \end{aligned}$$

Это противоречит тому, что x_* – точка локального минимума.

Что и требовалось доказать.

Замечание 2.5.1 Условия Куна-Таккера (2.5.2), (2.5.3) \iff

$$\iff \exists u_* = u_*[M] : \quad f'(x_*) = \sum_{i \in M} u_*[i] a'_i(x_*), \quad (2.5.7)$$

$$u_*[i] a_i(x_*) = 0, \quad u_*[i] \geq 0, \quad i \in M_1$$

(2.5.2), (2.5.3) $\Rightarrow u_*[i] = 0, \quad i \in M \setminus I(x_*) = M_1 \setminus M_1(x_*) \Rightarrow$

\Rightarrow (2.5.7), так как $M_1 = \underbrace{M_1(x_*)}_{\text{здесь } a_i=0} \cup \underbrace{(M_1 \setminus M_1(x_*))}_{\text{здесь } u_*[i]=0}$

(2.5.7) $\Rightarrow u_*[i] = 0$ при $i \in M \setminus I(x_*) = M_1 \setminus M_1(x_*)$ в силу условия дополнительности \Rightarrow (2.5.2), (2.5.3)

$$L(x, u) = f(x) - \sum_{i \in M} u[i] a_i(x) - \text{функция Лагранжа}$$

Первое из условий (2.5.7): $L'_x(x_*, u_*) = \emptyset$

Пример 2.5.1

$$\Omega \subset \mathbb{R}^2 : \begin{cases} a_1(x) := x_1^3 - x_2 \geq 0 \\ a_2(x) := -x_1^4 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

<-!-РИСУНОК-!->

$$f_1(x) := x_1 \rightarrow \inf$$

$$x \in \Omega$$

Единственное решение: $x_* = (0, 0)$

$$I(x_*) = \{1, 2\}$$

$$f'_1(x) = (1, 0); \quad f'_1(x_*) = (1, 0)$$

$$a'_1(x) = (3x_1^2, -1); \quad a'_1(x_*) = (0, -1)$$

$$a'_2(x) = (-4x_1^3, 1); \quad a'_2(x_*) = (0, 1)$$

$f'_1(x_*) = u_1^* a'_1(x_*) + u_2^* a'_2(x_*)$ не выполняется ни при каких U_i (см. первую компоненту)

Причина: ограничения в x_* нерегулярны (градиенты линейно зависимы).

$$f_2(x) := x_2 \rightarrow \inf$$

$$x \in \Omega$$

Единственное решение: $x_* = (0, 0)$

$$f'_2(x_*) = (0, 1); \quad a_i \text{ те же}$$

$$f'_2(x_*) = a'_2(x_*), \quad u_1^* = 0, \quad u_2^* = 1 \Rightarrow$$

\Rightarrow условия Куна-Таккера выполнены

Задачи

16*

$$f(x) \rightarrow \inf$$

$$\Omega : \begin{cases} a_i(x) \geq 0, \quad i \in M \\ x \in V \end{cases}$$

$V \subset \mathbb{R}^N$ – открытое выпуклое множество, $f, a_i \in C^1(V)$, f выпукла на V , a_i вогнуты на V (т.е. $-a_i$ выпуклы на V).

Доказать, что если в точке $x_* \in \Omega$ выполнены условия Куна-Таккера,
а именно $\exists u_* = u_*[M]$:

$$f'(x_*) = \sum_{i \in M} u_*[i] a'_i(x_*),$$

$$u_*[i] a_i(x_*) = 0, \quad u_*[i] \geq 0, \quad i \in M,$$

то x_* – глобальное решение задачи.

17* $V \subset \mathbb{R}^N$ – открытое выпуклое множество, $f \in C^2(V)$. Докажите, что
 f выпукла на $V \iff \langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \forall h \in \mathbb{R}^N \quad \forall x \in V$.

2.6 Достаточные условия строгого локального минимума

$$f(x) \rightarrow \inf \quad (2.6.1)$$

$$\Omega \begin{cases} a_i(x) \geq 0, & i \in M_1 \\ a_i(x) = 0, & i \in M_2 \\ x \in U \end{cases}$$

$U \in \mathbb{R}^N$ – открытое множество

Определение 2.6.1 $x_* \in \Omega$ – точка строгого локального минимума:

$$\exists \delta > 0 : f(x) > f(x_*) \quad x \in \Omega \cap \dot{U}_\delta(x_*).$$

Предположим, что в точке $x_* \in \Omega$ выполнены условия Куна-Таккера:

$$\exists u_* = u_*[M] : f'(x_*) = \sum_{i \in M} u_*[i] a'_i(x_*),$$

$$u_*[i] a_i(x_*) = 0, \quad u_*[i] \geq 0, \quad i \in M_1$$

$$M_1^+(x_*) := \{i \in M_1(x_*) \mid u_*[i] > 0\}$$

$$I^+(x_*) := M_1^+(x_*) \cup M_2$$

<-!-РИСУНОК!->

$$u_*[i] = 0, \quad i \in M_1 \setminus I^+(x_*) = M_1 \setminus M_1^+(x_*) \quad (2.6.2)$$

Конус G_* :

$$\langle a'_i(x_*), g \rangle = 0, \quad i \in I^+(x_*)$$

$$\langle a'_i(x_*), g \rangle \geq 0, \quad i \in I(x_*) \setminus I^+(x_*)$$

Теорема 2.6.1 В точке $x_* \in \Omega$ выполнены условия Куна-Таккера, $G_* = \{\emptyset\} \Rightarrow x_*$ – точка строгого локального минимума.

Доказательство.

От противного.

$$\exists \{y_k\}, \quad y_k \in \Omega, \quad y_k \neq x_*, \quad y_k \rightarrow x_*, \quad f(y_k) \leq f(x_*)$$

$$y_k = x_* + \lambda_k g_k, \quad g_k = \frac{y_k - x_*}{\|y_k - x_*\|}, \quad \lambda_k = \|y_k - x_*\|;$$

$\|g_k\| = 1$, $\lambda_k \rightarrow +0$ Из $\{g_k\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность: Пусть $g_k \rightarrow g_*$, $\|g_*\| = 1$

(!) $g_* \in G_*$; получим противоречие.

$i \in M_1(x_*)$:

$$0 \leq \underbrace{a_i(y_k)}_{\geq 0} - \underbrace{a_i(x_*)}_{=0} = \langle a'_i(\eta_k), g_k \rangle \lambda_k$$

$$i \in M_2: 0 = a_i(y_k) - a_i(x_*) = \langle a'_i(\eta_k), g_k \rangle \lambda_k$$

$$0 \geq f(y_k) - f(x_*) = \langle f'(y_k), g_k \rangle \lambda_k$$

Делим на $\lambda_k > 0$, $k \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned}\langle a'_i(x_*), g_* \rangle &\geq 0, \quad i \in M_1(x_*) \\ \langle a'_i(x_*), g_* \rangle &= 0, \quad i \in M_2 \\ \langle f'(x_*), g_* \rangle &\leq 0 \\ I(x_*) &= M_1(x_*) \cup M_2; \quad I(x_*) \setminus I^+(x_*) = M_1(x_*) \setminus M_1^+(x_*)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(!) \langle a'_i(x_i), g_* \rangle &= 0, \quad i \in M_1^+(x_*) \\ 0 \geq \langle f'(x_*), g_* \rangle &\stackrel{\text{(Кун-Таккер)}}{=} \sum_{i \in M} u_*[i] \langle a'_i(x_*), g_* \rangle = \\ \stackrel{(2.6.2)}{=} \sum_{i \in I^+(x_*)} u_*[i] \underbrace{\langle a'_i(x_*), g_* \rangle}_{=0 \text{ при } i \in M_2} &= \sum_{i \in M_1^+(x_*)} u_*[i] \underbrace{\langle a'_i(x_*), g_* \rangle}_{>0} \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle a'_i(x_*), g_* \rangle &= 0, \quad i \in M_1^+(x_k) \\ g_* \in G_*; \text{ противоречие (ибо } g_* \neq \emptyset\text{)}\end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Следствие 2.6.1 $x_* \in \Omega$, выполняются условия Куна-Таккера,
 $|I^+(x_*)| = |N|$, $a'_i(x_*)$, $i \in I^+(x_*)$, ЛНЗ \Rightarrow
 $\Rightarrow x_*$ — точка строгого локального мин.

Доказательство.

$G_* = \{\emptyset\}$, т.к. $\langle a'_i(x_*), g \rangle = 0$, $i \in I^+(x_*) \Rightarrow$
 $\Rightarrow g = \emptyset$
(Количество уравнений равно размерности g ;
в силу лин. независимости матрица системы неособая)

Что и требовалось доказать.

Пример 2.6.1 $f(x) = -x_1 \rightarrow \inf$
 $a_1(x) := x_1^3 - x_2 \geq 0$
 $a_2(x) := -x_1^4 + x_2 \geq 0$
 $x \in \mathbb{R}^2$

<-!-РИСУНОК-!->

$x_* = (1, 1)$ — единственное решение; $I(x_*) = \{1, 2\}$
 $f'(x_*) = (-1, 0)$
 $a'_1(x_*) = (3, -1)$
 $a'_2(x_*) = (-4, 1)$

<-!-РИСУНОК-!->

$f'(x_*) = a'_1(x_*) + a'_2(x_*)$; $u_* = \underbrace{(1, 1)}$
множители Лагранжа

выполняются условия Куна-Таккера.

$I^+(x_*) = \{1, 2\}$, $|I^+(x_*)| = 2 = |N|$
 $a'_1(x_*)$ и $a'_2(x_*)$ ЛНЗ.

По следствию x_* — точка строгого локального min.

Градиент — направление наибольшего возрастания функции.

$G_* \neq \{\emptyset\}$

$F \in C^1(U)$

F дважды дифф. в т. $x \in U$, если $\exists D = D[N, N]$,

$F'(x + h) = F'(x) + Dh + o(\|h\|)$,

$$\frac{O(\|h\|)}{\|h\|} \rightarrow \mathbb{O} \quad (h \rightarrow \mathbb{O})$$

Необходимо $D[i, j] = \frac{\partial^2 F(x)}{\partial x[i] \partial x[j]}$; $D = F''(x)$

$F \in C^2(U)$, если $F''(x)$ непр. на U

Пример 2.6.2 $Q(x) = \frac{1}{2}\langle Dx + x \rangle + \langle c, x \rangle + \alpha$, $D^T = D$

$$Q' = Dx + c$$

$$Q'(x + h) - Q'(x) = D(x + h) + c - D(x) - c = Dh$$

$$Q \in C^2(\mathbb{R}^N), Q'' = D$$

Теорема 2.6.2 (о среднем.)

$F \in C^2(U); \quad \underbrace{[x, x + h]}_{\text{отрезок, соединяющий } x \text{ и } x + h} \subset U$

<-!-PICTURE-!->

$$F(x + h) = F(x) + \langle F'(x), h \rangle + \frac{1}{2}\langle F''(x + \vartheta h)h, h \rangle \quad (2.6.3)$$

$$\vartheta \in (0, 1)$$

Теорема 2.6.3 $x_* \in \Omega$, выполнены условия Куна-Таккера

$$(L'(x_*, u_*)) = \mathbb{O},$$

$$u_*[i]a_i(x_*) = 0, u_*[i] \geq 0, i \in M_1$$

u

$$\langle L''_{xx}(x_*, u_*)g_*, g_* \rangle > 0, g \in G_*, g \neq \mathbb{O} \Rightarrow \quad (2.6.4)$$

$\Rightarrow x_*$ — точка строгого лок. min.

Доказательство.

От противного.

Пусть $\exists \{y_k\}$, $y_k \in \Omega$, $y_k \neq x_*$, $y_k \rightarrow x_*$, $f(y_k) \leq f(x_*)$

$y_k = x_* + \lambda_k g_k$, $g_k \rightarrow g_*$ $\|g_k\| = 1$ и т.д.

Известно, что $g_* \in G_*$, $\|g_*\| = 1$.

По условию теоремы (2.6.4) $\langle L''_{xx}(x_*, u_*)g_*, g_* \rangle > 0$

(!) $\langle L''_{xx}(x_*, u_*)g_*, g_* \rangle \leq 0$

Вместе с этим имеем

$$L(y_k, u_*) - L(x_*, u_*) = \underbrace{f(y_k) - f(x_*)}_{\leq 0} -$$

$$- \sum \underbrace{i \in M}_{\text{или } i \in M_1} \underbrace{u_*[i]}_{\geq 0} \underbrace{(a_i(y_k) - a_i(x_*))}_{\geq 0} \leq 0$$

$$u_*[i]a_i(x_*) = 0, i \in M_1$$

$$0 \geq L(y_k, u_*) - L(x_*, u_*) \stackrel{(2.6.3)}{=} \underbrace{\langle L'_x(x_*, u_*)g_k, g_k \rangle}_{=0} \lambda_k +$$

$$+ \frac{1}{2}\langle L''_{xx}(x_* + \nu_k \lambda_k g_k, u_*)g_k, g_k \rangle \lambda_k^2$$

Делим на $\frac{1}{2}\lambda_k > 0$; $k \rightarrow +\infty$.
 $\langle L''_{xx}(x_*, u_*)g_*, g_* \rangle \leq 0$. Противоречие (2.6.4).

Что и требовалось доказать.

Задачи

18

$$H(x_1, x_2) = \frac{2}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}}$$

Докажите, что $H(x_1, x_2)$ вогнута при $x_1, x_2 > 0$.

19* $F \in C^2(U)$, $\Omega \subset U$ — выпуклый компакт,
 $U \subset \mathbb{R}^N$ — открытое множество.

Доказать, что F на Ω можно представить в виде разности выпуклых функций.

2.7 Необходимые условия оптимальности второго порядка

$$f(x) \rightarrow \inf \quad (2.7.1)$$

$$\Omega \begin{cases} a_i(x) \geq 0, i \in M_1 \\ a_i(x) = 0, i \in M_2 \\ x \in U \end{cases}$$

U — открытое множество в \mathbb{R}^N
 $f, a_i \in C^2(U)$

Теорема 2.7.1 $x_* \in \Omega$ — точка локального минимума, ограничения в ней регулярны (градиенты активных ограничений линейно независимы).
 Тогда выполняются условия Куна-Таккера

$$[\exists u_* : L'_x(x_*, u_*) = \mathbb{O}, u_*[i]a_i(x_*) = 0, u_*[i] \geq 0, i \in M_1].$$

Кроме того, выполняется

$$\langle L''_{xx}(x_*, u_*)g, g \rangle \geq 0 \forall g \in G_* \quad (2.7.2)$$

$$G_* : \begin{aligned} \langle a'_i(x_*), g \rangle &= 0, i \in I^+(x_*) \\ \langle a'_i(x_*), g \rangle &\geq 0, i \in I(x_*) \setminus I^+(x_*) \\ u_*[i] &= 0, i \in M \setminus I^+(x_*) \end{aligned} \quad (2.7.3)$$

Доказательство.

Фиксируем $g \in G_*$, $g \neq \mathbb{O}$. Докажем, что выполнено (2.7.2).

$$I_g(x_*) = \{i \in I(x_*) \mid \langle a'_i(x_*), g \rangle = 0\}$$

$$M_2 \subset I^+(x_*) \subset I_g(x_*) \subset I(x_*) \quad (2.7.4)$$

$$\langle a'_i(x_*), g \rangle > 0, i \in I(x_*) \setminus I_g(x_*) \quad (2.7.5)$$

Рассмотрим систему

$$a_i(x) = 0, i \in I_g(x_*) \quad (2.7.6)$$

x_* удовлетворяет (2.7.6), $a'_i(x_*)$, $i \in I_g(x_*)$, линейно независимы

По основной лемме нелинейного программирования

\exists гладкая кривая $x = x(t)$:

$x(0) = x_*$, $x'(0) = g_*$, $a_i(x(t)) = 0$, $i \in I_g(x_*)$, при малых t .

Докажем, что $x(t) \in \Omega$ при малых $t > 0$.

При $i \in I_g(x_*)$ — равенство (в ограничениях).

При $i \in I(x_*) \setminus I_g(x_*)$:

$$a_i(x(t)) = a_i(x(0)) + \langle a'_i(x(0)), x'(0) \rangle t + o(t) = t \left[\underbrace{\langle a'_i(x_*), g \rangle}_{>0} + \frac{o(t)}{t} \right] \text{ при малых } t > 0$$

(последнее равенство — при $g := x'(0)$ и поскольку $a_i(x_*) = 0$)

$$i \in M \setminus I(x_*) : a_i(x_*) > 0 \Rightarrow a_i(x(t)) > 0 \text{ при малых } t > 0$$

Установлено, что $x(t) \in \Omega$ при малых $t > 0$.

$$\begin{aligned}
L(x(t), u_*) &= f(x(t)) - \sum_{i \in M} u_*[i] a_i(x(t)) = f(x(t)) - \sum_{i \in I^+(x_*)} u_*[i] \underbrace{a_i(x(t))}_{=0, \text{ ибо } I^+(x_*) \subset I_g(x_*)} = f(x(t)) \\
L(x_*, u_*) &= f(x_*) \stackrel{\text{ЛОК. МИН.}}{\leq} f(x(t)) = L(\underbrace{x(t)}_{\text{в окрестности } x_*}, u_*) = \\
&= L(x_*, u_*) + \langle L'_x(x_*, u_*), x(t) - x_* \rangle + \frac{1}{2} \langle L''_{xx}(\xi(t), u_*) \cdot (x(t) - x_*), x(t) - x_* \rangle, \xi(t) \in [x_*, x(t)] \Rightarrow \\
&\Rightarrow \left\langle L''_{xx}(\xi(t), u_*) \frac{x(t) - x(0)}{t}, \frac{x(t) - x(0)}{t} \right\rangle \geq 0 \text{ при малых } t > 0 \\
&t \rightarrow +0 : \quad \langle L''_{xx}(x_*, u_*) g, g \rangle \geq 0 \\
&\left(\frac{x(t) - x(0)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +0]{} x'(0) = g \right)
\end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Пример 2.7.1

$$\begin{aligned}
f(x) &:= (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \rightarrow \inf \\
a(x) &:= -x_1 + \alpha x_2^2 \geq 0
\end{aligned}$$

$\alpha \in \mathbb{R}$ — параметр

$x_* = (0, 0)$ — единственное решение

Ограничение активно

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 2x_2 \end{pmatrix}; \quad f'(x_*) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad f''(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\
a'(x) &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2\alpha x_2 \end{pmatrix}; \quad a'(x_*) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (условие регулярности выполнено)} \\
f'(x_*) &= 2a'(x_*) \text{ — условие Куна-Таккера выполнено с } u_* = 2 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \\
I^+(x_*) &= I(x_*) \\
G_* : \quad \langle a'(x_*), g \rangle &= 0 \iff g_1 = 0 \\
G_* &= \{g = (0, g_2)\} \\
a''(x) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{pmatrix} \\
L''_{xx}(x_*, u_*) &= f''(x_*) - u_* a''(x_*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 - 4\alpha \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{На } G_* \langle L''_{xx}(x_*, u_*) g, g \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 - 4\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ g_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ g_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (2 - 4\alpha)g_2^2$$

$\alpha < \frac{1}{2} \Rightarrow \langle L''_{xx}(x_*, u_*) g, g \rangle > 0 \forall g \in G_* \setminus \{0\} \Rightarrow x_*$ — точка строгого локального минимума по теореме 2.6.3.

$\alpha > \frac{1}{2} \Rightarrow \langle L''_{xx}(x_*, u_*) g, g \rangle < 0 \forall g \in G_* \setminus \{0\}$, т.е. условие оптимальности второго порядка не выполнено.

Значит, не является точкой строгого локального минимума по теореме 2.7.1.

$\alpha = \frac{1}{2} - ?$

Задача

20* Решить экстремальную задачу:

$$f(x) := (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \rightarrow \inf$$

$$-x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 \geq 0$$

3 Часть III. Вариационные задачи

3.1 Квадратичные вариационные задачи. Критерий оптимальности

$$p, g, f \in C[a, b]$$

$$\begin{aligned} Q(x) &= \int_a^b \{p(t)[x'(t)]^2 + g(t)[x(t)]^2 - 2f(t)x(t)\} dt, x \in C^1[a, b] \\ Q(x) &\rightarrow \inf \quad (3.1.1) \\ \Omega : x(a) = A, x(b) = B, x &\in C^1[c, b] \end{aligned}$$

<-!-РИСУНОК-!->

$x \in \Omega$ – план.

$x_* \in \Omega$ – решение (оптимальный план): $Q(x) \geq Q(x_*) \quad \forall x \in \Omega$

$C_0^1[a, b] = \{L \in C^1[a, b] | h(a) = 0, h(b) = 0\}$ – множество допустимых вариаций

$$\begin{aligned} x \in \Omega, h \in C_0^1[a, b] &\Rightarrow x + \alpha h \in \Omega \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \\ Q(x + \alpha h) &= \int_b^a \{p(x' + \alpha h')^2 + g(x + \alpha h)^2 - 2f(x + \alpha h)\} dt = \\ &= Q(x) + 2L \int_a^b \{px'h' + gxh - fh\} dt + L^2 \int \int_a^b \{p(h')^2 + gh^2\} dt \\ l(x, h) &= \int_a^b \{px'h' + (gx - f)h\} dt \text{ – линейный по } h \text{ функционал} \\ [l(x; -h) &= -l(x; h)] \\ D(h) &= \int_b^a \{p(h')^2 + gh^2\} dt \\ Q(x + \alpha h) &= Q(x) + 2\alpha l(x; h) + \alpha^2 D(h) \quad (3.1.2) \end{aligned}$$

Лемма 3.1.1 Если $\exists h_0 \in C_0^1[a, b] : D(h_0) < 0$, то

$$\inf_{x \in \Omega} Q(x) = -\infty.$$

Доказательство.

Фиксируем $x_0 \in \Omega$.

$Q(x_0 + \alpha h_0)$ – квадратичный трехчлен отн. α , коэффициент у α^2 отрицательный $\Rightarrow \inf Q(x_0 + \alpha h_0) = -\infty$

Что и требовалось доказать.

$$D(h) \geq 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \quad (3.1.3)$$

Очевидное достаточное условие: $p(t) \geq 0, g(t) \geq 0$ на $[a, b]$,
считаем его выполненным.

Теорема 3.1.1 $x_* \in \Omega$ – оптимальный план (3.1.1) \Leftrightarrow

$$\Leftrightarrow l(x_*; h) = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b]. \quad (3.1.4)$$

Доказательство.

Необходимость:

$$0 \leq Q(x_* + \alpha h) - Q(x_*) \underset{h \in C_0^1[a, b]}{\stackrel{(3.1.2)}{=}} 2\alpha l(x_*; h) + \alpha^2 D(h).$$

Поделим на

$$\begin{aligned} 2\alpha > 0, \quad \alpha \rightarrow +0 : l(x_*; h) &\geq 0 \\ h \in C_0^1[a, b] \Leftrightarrow -h &\in C_0^1[a, b] \end{aligned}$$

Имеем $l(x_*; -h) \geq 0 \Leftrightarrow l(x_*; h) \leq 0$

Достаточность:

Фиксируем $x \in \Omega$, $h = x - x_*$; $h \in C_0^1[a, b]$.

$$Q(x) = Q(x_* + h) \stackrel{(3.1.2)}{=} Q(x_*) + \underbrace{2l(x_*; h)}_{=0} + \underbrace{D(h)}_{\geq 0} \geq Q(x_*)$$

Что и требовалось доказать.

Лемма 3.1.2 $u \in C[a, b]$, $\int_a^b u h' dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \Rightarrow u = \text{const на } [a, b]$

Доказательство.

$$u_1(t) = \int_a^t u(\tau) d\tau$$

Найдем $p_1(t) = c_0 t + c_1$: $p_1(a) = u_1(a), p_1(b) = u_1(b)$

$$h(t) := u_1(t) - p_1(t); \quad h(a) = h(b) = 0$$

$$h \in C^1[a, b] : h'(t) = u(t) - c_0, \quad h \in C_0^1[a, b]$$

$$\int_a^b [u(t) - c_0]^2 dt = \int_a^b [u(t) - c_0] h'(t) dt = \underbrace{\int_a^b u(t) h'(t) dt}_{=0} - \underbrace{\int_a^b c_0 h'(t) dt}_{=0, \text{ ибо } h(a)=h(b)} \Rightarrow u(t) \equiv c_0$$

Что и требовалось доказать.

Лемма 3.1.3 Основная лемма вариационного исчисления.

$u, v \in C[a, b]$,

$$\int_a^b \{uh' + vh\} dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \Rightarrow u \in C^1[a, b] \text{ и } u'(t) = v(t) \text{ на } [a, b]$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_a^t v(\tau) d\tau \\ \int_a^b v h dt &= \int_a^b g' h dt = \int_a^b h dg = \underbrace{hg|_a^b}_{=0, \text{ ибо } h(a)=h(b)=0} - \int_a^b g h' dt = \end{aligned}$$

$$= - \int_a^b g h' dt$$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b \{u h' + v h\} dt = \int_a^b (u - g) h' dt \forall h \in C_0^1[a, b] \Rightarrow \\ &\Rightarrow u(t) - g(t) \equiv const, u(t) = g(t) + const \Rightarrow u' \exists, u' = v \text{ на } [a, b]. \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

$$(3.1.4) : \int_a^b \{px'_* h' + (gx_* - f)h\} dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \quad (3.1.5)$$

Теорема 3.1.2

$$\begin{aligned} x_* \in \Omega - \text{оптимальный план} &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow px'_* \in C^1[a, b] \text{ и } (px'_*)' + gx_* &= f. \end{aligned} \quad (3.1.6)$$

Доказательство.

Необходимость:

Следует из (3.1.5) и основной леммы.

Достаточность:

Покажем, что из условий теоремы следует (3.1.5).

$$\begin{aligned} \int_a^b px'_* h' dt &= \int_a^b px'_* dh = \underbrace{px'_* h|_a^b}_{=0} - \int_a^b (px'_*)' h dt \\ \int_a^b \{px'_* h' + (gx_* - f)h\} dt &= \int_a^b \{-(px'_*)' + gx_* - f\} h dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \\ x_* &- \text{оптимальный план по теореме (критерию).} \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

$$\begin{aligned} L(x, t) &:= -\frac{d}{dt} \left(p \frac{dx}{dt} \right) + gx = f \quad (3.1.7) \\ x(a) &= A, x(b) = B \end{aligned}$$

дифференциальное уравнение 2-ого порядка, краевые условия
 $L(x, t)$ — оператор Штурма-Лиувилля

Пример 3.1.1

$$\begin{aligned} \int_0^1 \{(x')^2 + tx\} dt &\rightarrow \inf \\ x(0) = x(1) &= 0, x \in C^1[0, 1] \end{aligned}$$

<-!-РИСУНОК!->

$$\begin{aligned}
p(t) &\equiv 1, \quad g(t) \equiv 0 \quad [p, g \geq 0], \quad f(t) = -1/2t \\
-x'' &= -1/2t \Leftrightarrow x'' = 1/2t \Rightarrow x' = 1/4t^2 + c_0 \Rightarrow x = 1/12t^3 + c_0t + c_1 \\
x(0) &= 0 \Rightarrow c_1 = 0 \\
x(1) &= 0 \Rightarrow c_0 = -1/12 \\
x_*(t) &= 1/12(t^3 - t)
\end{aligned}$$

Задачи

1*

$$Q(x) = \int_0^1 \{(x')^2 + x^2\} dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1]$$

2

$$Q(x) = \int_1^2 \frac{(x')^2}{t^3} dt \rightarrow \inf$$

$$x(1) = 1, \quad x(2) = 0, \quad x \in C^1[1, 2]$$

3

$$Q(x) := \int_0^1 [x(t)]^2 dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1]$$

Докажите, что задача не имеет решения. Найдите $\inf Q(x)$.

$$D(h) = \int_a^b \{ p(h')^2 + gh^2 \} dt \geq 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b]$$

Достаточно $p(t) \geq 0, q(t) \geq 0$ на $[a, b]$.

Теорема 3.1.3 (Лежандра).

Если D – неотрицательно определенная интегральная квадратичная форма, то необходимо

$$p(t) \geq 0 \text{ на } [a, b] \tag{3.1.8}$$

(Именно условие (3.1.8) называется условием Лежандра.)

Доказательство.

(От противного): $\exists t_0 \in (a, b) : p(t_0) < 0$

$$\varepsilon_0 = -p(t_0)/2, \quad \exists \delta_0 > 0 \mid p(t) - p(t_0) \mid \leq \varepsilon_0 \text{ на } [t_0 - \delta_0, t_0 + \delta_0]$$

$$[t_0 - \delta_0, t_0 + \delta_0] \subset [a, b] \Rightarrow$$

$$p(t) \leq p(t_0) + \varepsilon_0 = -\varepsilon_0 \Rightarrow p(t) \leq -\varepsilon_0 \text{ на } [t_0 - \delta_0, t_0 + \delta_0]$$

$$\delta \in (0, \delta_0] :$$

$$h_\delta(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{\delta}{\pi}}(1 + \cos(\frac{\pi}{\delta}(t - t_0))), & t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \\ 0, & \text{иначе} \quad <! - PICTURE - ! > \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
h'_\delta(t) &= -\sqrt{\frac{\delta}{\pi}} \sin\left(\frac{\delta}{\pi}(t-t_0)\right) \text{ на } (t_0-\delta, t_0+\delta) \\
h'_\delta(t) &\rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow t_0-\delta, t \rightarrow t_0+\delta \\
h_\delta(t) &\in C_0^1[a, b] \\
0 \leq h_\delta(t) &\leq 2\sqrt{\frac{\delta}{\pi}} \text{ на } [a, b] \\
D(h_\delta) &= \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} p(h'_\delta)^2 dt + \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} g(h_\delta)^2 dt \leq -\varepsilon \frac{\pi}{\delta} \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} \sin^2\left(\frac{\pi}{\delta}(t-t_0)\right) dt + \frac{4\delta}{\pi} \int_a^b |g| dt = \\
&= \underbrace{-\varepsilon_0 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 u du}_{<0} + \underbrace{\frac{4\delta}{\pi} \int_a^b |g| dt}_{\rightarrow 0 \text{ при } \delta \rightarrow 0} < 0 \text{ при малых } \delta > 0
\end{aligned}$$

Получили противоречие

Что и требовалось доказать.

$p(t) > 0$ на $[a, b]$ — усиленное условие Лежандра

Пример: (даже усиленное условие не является достаточным)

$$D_\lambda(h) = \int_0^\pi ((h')^2 - \lambda h^2) dt, h \in C_0^1[0, \pi]$$

$p(t) \equiv 1$ — усиленное условие Лежандра выполнено

$$h_0(t) = \sin t, h_0 \in C_0^1[0, \pi]$$

$$D_\lambda(h_0) = \int_0^\pi (\cos^2 t - \lambda \sin^2 t) dt = \frac{\pi}{2}(1 - \lambda) < 0 \text{ при } \lambda > 1$$

Задачи

4*

$$Q(x) := \int_{-1}^1 t^2 [x'(t)]^2 dt \rightarrow \inf$$

$$x(-1) = -1, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1]$$

Докажите, что задача не имеет решения. Найдите $\inf Q(x)$.

5*

$$J(x) := \int_a^b [\alpha(t) x'(t) + \beta(t) x(t)] dt \rightarrow \inf$$

$$x(a) = A, \quad x(b) = B, \quad x \in C^1[a, b]$$

Докажите, что либо задача не имеет решения, либо все ее планы оптимальны. Сформулируйте соответствующие условия в терминах функций α и β .

6 (Лемма Лагранжа)

$$\alpha \in C[a, b]$$

$$\int_a^b \alpha(t) h(t) dt = 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b]$$

Докажите, что $\alpha(t) \equiv 0$.

3.2 Критерий неотрицательной определенности квадратичной формы

$$D(h) = \int_a^b \{p(h')^2 + gh^2\} dt, h \in C_0^1[a, b], g \in C[a, b], p \in C^1[a, b], \underbrace{p(t) > 0}_{\text{усиленное условие Лежандра}}$$

(3.2.1)

Рассмотрим

$$(ph')' = gh \quad (3.2.2)$$

$$ph'' + p'h' - gh = 0 \text{ на } [a, b]$$

$$h'' + \frac{p'}{p}h' - \frac{g}{p}h = 0 \text{ — уравнение Якоби} \quad (2')$$

При любых начальных условиях

$$L(c) = A, h'(c) = A', c \in [a, b]$$

задача (2') имеет единственное решение.

Решение, удовлетворяющее условию $h_0(a) = 0, h'_0(a) = 1$, называется главным решением уравнения Якоби.

Теорема 3.2.1 (Якоби).

D неотрицательно определена на

$$C_0^1[a, b] \Leftrightarrow \underbrace{h_0(t) > 0 \text{ на } (a, b)}_{\text{условие Якоби}}$$

Доказательство.

Достаточность:

$$(!) (\text{Выполнено условие Якоби} \Rightarrow D(h) = \int_a^b p(h' - \frac{h}{h_0}h'_0)^2 dt)$$

$$\frac{h}{h_0} \text{ непр. на } [a, b] (h \in C_0^1[a, b])$$

$$\lim_{t \rightarrow a+0} \frac{h(t)}{h_0(t)} = \lim_{t \rightarrow a+0} \frac{h'(t)}{h'_0(t)} = h'(a)$$

$$\lim_{t \rightarrow b-0} \frac{h(t)}{h_0(t)} : (h_0(t) > 0 \text{ на } (a, b))$$

$$1. h_0(b) > 0 \quad \lim = \frac{h(b)}{h_0(b)}$$

$$2. h_0(b) = 0, \text{ но тогда } h'_0(b) \neq 0,$$

иначе по теореме единственности $h_0(t) \equiv 0$ (для решения уравнения Якоби)

$$\lim = \lim_{t \rightarrow b-0} \frac{h(t)}{h_0(t)} = \frac{h'(b)}{h'_0(b)}$$

$$\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} p \left(h' - \frac{h}{h_0} h'_0 \right) dt = \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} p(h')^2 dt - 2 \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \frac{ph'_0}{h_0} hh' dt + \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} p \left(\frac{h'_0}{h_0} \right) h^2 dt$$

(3.2.3)

$$\begin{aligned}
-2 \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \frac{ph'_0}{h_0} hh' dt &= \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} -\frac{ph'_0}{h_0} dh^2 = \\
&= -\frac{ph'_0}{h_0} h_0^2 \Big|_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} + \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \left(\frac{ph'_0}{h_0} \right)' h^2 dt \\
\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \left(\frac{ph'_0}{h_0} \right)' h^2 dt &= \underbrace{\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \frac{(ph'_0)'}{h_0} h^2 dt}_{\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} qh^2 dt} - \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} \left(\frac{(ph'_0)}{h_0} \right)^2 h^2 dt
\end{aligned}$$

Подставим в (3.2.3):

$$\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} p \left(h' - \frac{h}{h_0} h'_0 \right) dt = \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} p(h')^2 dt + \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} gh^2 dt - \frac{ph'_0}{h_0} h_0^2 \Big|_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon}$$

$$\varepsilon \rightarrow +0 \text{ (учесть, что } h \in C_0^1[a, b])$$

Необходимость:

Лемма 3.2.1 (лемма о скруглении углов).

$$\hat{h} \in C[a, b], \hat{h}(a) = \hat{h}(b) = 0$$

$$\hat{h} \in C^1[a, \xi], \hat{h} \in C^1[\xi, b] \text{ при некотором } \xi \in (a, b)$$

$$D(h) \geq 0 \text{ на } C_0^1[a, b] \Rightarrow D(\hat{h}) \geq 0$$

Доказательство.

$$g(t) = \begin{cases} (\frac{1-|t|}{2})^2, & t \in [-1, 1] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

<-!-РИСУНОК-!->

Очевидно, что g — четная функция.

Возьмем $t \in (0, 1)$ и продифференцируем:

$$g'(t) = 2 \frac{1-t}{2} (-\frac{1}{2}) = -\frac{1-t}{2} // g(t) \leq \frac{1}{4}$$

$$g'(0) = -\frac{1}{2}$$

В силу четности $g'(-0) = \frac{1}{2}$ и более общее заключение: $|g'(t)| \leq \frac{1}{2}$ при $t \neq 0$

Сделаем гомотетию с центром в нуле:

$$g_\delta(t) = \delta g(\frac{t}{\delta}), \delta > 0$$

$$g_\delta(t) = 0 \text{ вне } (-\delta, \delta)$$

// Т.к. если $t = \delta$, то $\frac{t}{\delta} = 1$

Значит, $0 \leq g_\delta(t) \leq \frac{\delta}{4}$

$$g'_\delta(t) = g'(\frac{t}{\delta})$$

Следовательно, $g'_\delta(0_+) = -\frac{1}{2}, g'_\delta(0_-) = \frac{1}{2} \forall \delta > 0$.

Кроме того, $|g'_\delta(t)| \leq \frac{1}{2}$ при $t \neq 0 \forall \delta > 0$.

Введем функции $h_\delta(t) = \hat{h}(t) + \alpha_1 g_\delta(t - \varepsilon)$, где $\alpha_1 = \hat{h}'(\xi_+) - \hat{h}'(\xi_-)$, то есть скачок производной в точке ξ

$h_\delta \in C_0^1[a, b]$ при малых $\delta > 0$

// надо, чтобы $[\xi - \delta, \xi + \delta] \subset (a, b)$; тогда $h_\delta(a) = h_\delta(b) = 0$

Тогда проверяем, чтобы было C_0 и C^1 :

$$h'_\delta(\xi + 0) = \hat{h}'(\xi + 0) + (-\frac{1}{2})\alpha_1$$

$$h'_\delta(\xi - 0) = \hat{h}'(\xi - 0) + (\frac{1}{2})\alpha_1$$

$$h'_\delta(\xi + 0) - h'_\delta(\xi - 0) = 0$$

Итак, доказано, что $h_\delta \in C_0^1[a, b]$ при малых $\delta > 0$.

$$\text{Запишем: } 0 \leq D(h_\delta) = \int_a^b (p[\hat{h}' + \alpha_1 g'_\delta(\cdot - \xi)])^2 + q[\hat{h} + \alpha_1 g_\delta(\cdot - \xi)]^2 dt =$$

// честно возводим в квадрат

$$= D(\hat{h}) + \alpha_1 \int_a^b (q[2\hat{h}g_\delta(\cdot - \xi) + \alpha_1 g_\delta^2(\cdot - \xi)]) dt + \alpha_1 \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} (p[2\tilde{h}'g'_\delta(\cdot - \xi) + \alpha_1(g'_\delta(\cdot - \xi))^2]) dt =$$

// вводим новые обозначения: $I_\delta^{(0)}, I_\delta^{(1)}$

$$= D(\hat{h}) + \alpha_1 I_\delta^{(0)} + \alpha_1 I_\delta^{(1)}$$

Докажем, что $I_\delta^{(0)} \rightarrow 0, I_\delta^{(1)} \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$

$$|I_\delta^{(0)}| \leq \frac{\delta}{2} \int_a^b |q|(|\hat{h}| + |\alpha_1| \frac{\delta}{8}) dt; \quad g_\delta \leq \frac{\delta}{4} \Rightarrow \text{малость за счет } g_\delta$$

$$|I_\delta^{(1)}| \leq \left(\int_{\xi-\delta}^{\xi} + \int_{\xi}^{\xi+\delta} \right) (p|\hat{h}'| + \frac{|\alpha_1|}{4}) dt; \quad \text{малость за счет малости интеграла}$$

// $\alpha_1 = \text{const}$

Очевидно, что $I_\delta^{(0)} \rightarrow 0, I_\delta^{(1)} \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0_+$

Переходя к пределу, получаем, что $D(\hat{h}) \geq 0$

Что и требовалось доказать.

Лемма 3.2.2 Если \exists точка $\xi \in (a, b) : h_0(\xi) = 0$, то $\int_a^\xi (p(h'_0)^2 + qh_0^2) dt = 0$.

Доказательство.

$$\int_a^\xi p(h_0)^2 dt = \int_a^\xi ph'_0 h_0 dt = ph'_0 h_0|_a^\xi - \int_a^\xi qh_0^2 dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^\xi (p(h'_0)^2 + qh_0^2) dt = ph'_0 h_0|_a^\xi =$$

// $ph'_0 h_0|_a = 0$ по определению

// $ph'_0 h_0|^\xi = 0$ по условию леммы

$$= 0$$

Что и требовалось доказать.

Теперь доказываем необходимость в теореме:

Предположим, что $\exists \xi \in (a, b) : h_0(\xi) = 0$.

<-!-РИСУНОК!->

[$h'_0(\xi) \neq 0$, иначе $h_0 \equiv 0$, что плохо в силу единственности решения]

Рассмотрим вариацию $\hat{h}(t) = h_0(t), t \in [a, \xi]$ и $\hat{h}(t) = 0, t \in [\xi, b]$

$\hat{h}(a) = \hat{h}(b) = 0$ по построению

$D(\hat{h}) = \int_a^\xi (p(h'_0)^2 + qh_0^2) dt = 0$ по предыдущей лемме

$D(\hat{h} + \alpha h) = D(\hat{h}) + 2\alpha l(\hat{h}, h) + \alpha^2 D(h)$

// $D(\hat{h}) = 0, h \in C_0^1[a, b], \alpha$ – вещественный параметр

Здесь $l(\hat{h}, h) = \int_a^b (\hat{h}'h' + \hat{h}\hat{h}') dt = \int_a^\xi (ph'_0 h' + qh_0 h) dt$

// последнее равенство следует из предыдущего рисунка

$$\int_a^\xi ph'_0 h' dt = \int_a^\xi dh = ph'_0 h|_a^\xi - \int_a^\xi qh_0 h dt // (ph'_0)' = qh_0$$

Тогда $l(\hat{h}, h) = p(\xi)h'_0 h(\xi) =: \lambda < 0$ при некотором h // $p(\xi) > 0, h'_0(\xi) \neq 0$

// Мы хотим, чтобы $\lambda < 0$

<!--РИСУНОК!-->

$$D(\hat{h} + \alpha h) = \alpha[2\lambda + \alpha D(h)] < 0 \text{ при малых } \alpha > 0$$

С другой стороны, $D(\hat{h} + \alpha h) \geq 0$ по лемме о скруглении углов. Получаем противоречие.

// m.e. $h_0(t) > 0$ на (a, b)

Что и требовалось доказать.

Замечание 3.2.1 Пусть выполнено условие Якоби и

$$\exists h_* \in C_0^1[a, b] : D(h_*) = 0.$$

Тогда $h_*(t) = \lambda h_0(t)$, $t \in [a, b]$ при некотором λ .

Доказательство.

$$D(h_*) = \int_a^b p(h'_* - \frac{h_*}{h_0} h'_0) dt; D(h_*) = 0 \text{ по условию}$$

Притом $p > 0$, подынтегральная функция непрерывна \Rightarrow

$$\Rightarrow h'_*(t) - \frac{h_*(t)}{h_0(t)} h'_0(t) = 0 \text{ на } (a, b)$$

Преобразуем и перепишем:

$$(*) = \frac{h'_*(t)h_0(t) - h'_*(t)h'_0(t)}{h_0^2(t)} = 0 \text{ на } (a, b)$$

// $h_0(t) > 0$ на $(a, b) \Rightarrow$ можно написать в знаменателе $h_0^2(t)$, а не $h_0(t)$,

// m.e. просто поделить еще на $h_0(t)$

$$(*) = \frac{h'_*(t)}{h_0(t)}' = 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{h'_*(t)}{h_0(t)} \equiv \lambda \text{ на } (a, b) \Rightarrow h_*(t) = \lambda h_0(t) \text{ на } (a, b) \Rightarrow \\ \text{по непрерывности и на } [a, b]$$

Что и требовалось доказать.

Задачи

7 Как изменится заключение основной леммы вариационного исчисления, если соотношение

$$\int_a^b (uh' + vh) dt = 0$$

выполняется для $h \in C^1[a, b]$, $h(a) = 0$?

8* $u \in C[a, b]$ и

$$\int_a^b uh'' dt = 0 \quad \forall h \in C_0^2[a, b]$$

$$(h(a) = h(b) = 0, \quad h'(a) = h'(b) = 0)$$

Докажите, что $u(t) = c_0 t + c_1$.

9* $u \in C[a, b]$ и

$$\int_a^b uh'' dt = 0 \quad \forall h \in C^2[a, b] : h(a) = h(b) = 0.$$

Докажите, что $u(t) \equiv 0$.

$$Q(x + \alpha h) = Q(x) + 2\alpha l(x; h) + \alpha^2 D(h)$$

$h_0(\xi) = 0$ при некотором $\xi \in (a, b) \Rightarrow \inf Q(x) = -\infty$

$h_0(b) :$

$$1. \ h_0(b) = 0$$

$$2. \ h_0(b) > 0$$

Теорема 3.2.2 Пусть выполнено условие Якоби и $h_0(b) = 0$; если x_* — некоторое решение квадратичной вариационной задачи, то все множество решений допускает представление

$$x(t) = x_*(t) + \lambda h_0(t) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad (3.2.4)$$

Доказательство.

Из условия Якоби и того, что ($h_0(b) = 0$), следует $h_0 \in C_0^1[a, b]$, $D(h_0) = 0$ (лемма в доказательстве необходимости теоремы Якоби; $\xi = b$).

Проверим, что x из (3.2.4) — решение:

$$Q(x_* + \lambda h_0) = Q(x_*) + 2\lambda \underbrace{l(x_*, h_0)}_{=0} + \lambda^2 \underbrace{D(h_0)}_{=0} = Q(x_*) \Rightarrow x_* + \lambda h_0 — \text{решение.}$$

Что это есть решение, мы установили, теперь установим, что все решения представимы в таком виде.

Итак, пусть x_1 — решение; тогда $h_1 = x_1 - x_* \in C_0^1[a, b]$

$$Q(x_1) = Q(x_* + h_1) = Q(x_*) + D(h_1) \quad Q(x_1) = Q(x_*) \Rightarrow D(h_1) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow (\text{почему это — вспомните замечание 3.2.1}) \quad h_1 = \lambda h_0 \Rightarrow x_1 = x_* + \lambda h_0$$

Что и требовалось доказать.

Задачи

10* Пусть выполнено условие Якоби и $h_0(b) = 0$, а также

$$B p(b) h'_0(b) - A p(a) - \int_a^b f h_0 dt \neq 0.$$

Докажите, что $\inf Q(x) = -\infty$.

11* Решить квадратичную вариационную задачу (пример Гильберта):

$$Q(x) = \int_0^1 \left[t^2 [x'(t)]^2 + 12x^2 \right] dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1]$$

12 Решить квадратичную вариационную задачу

$$\int_0^1 [2txx' + x^2] dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1]$$

3.3 Критерий положительной определенности интегральной квадратичной формы

$$D(h) = \int_a^b [p(h')^2 + qh^2] dt, \quad h \in C_0^1[a, b]$$

$$q \in C[a, b], \quad p \in C^1[a, b],$$

усиленное условие Лежандра $p(t) > 0$ на $[a, b]$.

D называется положительно определенной формой, если $D(h) > 0$ при $h \in C_0^1[a, b]$, $h \not\equiv 0$.

Теорема 3.3.1 D положительно определена \iff усиленное условие Якоби: $h_0 > 0$ на $(a, b]$.

Доказательство.

Необходимость:

Форма, по крайней мере, неотрицательно определена, из этого заключаем, что $h_0(t) > 0$ на (a, b) .

Если $h_0(b) = 0$, то $h_0 \in C_0^1[a, b]$, $D(h_0) = 0$,

что противоречит положительной определенности, ибо $h_0 \not\equiv 0$

Достаточность:

По крайней мере выполнено условие Якоби, из чего заключим, что $D(h) \geq 0$.

Допустим, что $D(h_*) = 0$.

По замечанию к теореме Якоби $h_*(t) = \lambda h_0(t)$ при некотором $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\underbrace{h_*(b)}_{=0} = \lambda \underbrace{h_0(b)}_{>0} \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow h_*(t) \equiv 0$$

Что и требовалось доказать.

Теорема 3.3.2 Пусть выполнено усиленное условие Якоби.

Тогда $\exists \mu > 0$:

$$D(h) \geq \mu \int_a^b (h')^2 dt \quad (3.3.1)$$

$\forall h \in C_0^1[a, b]$.

Доказательство.

$D_\mu(h) := \int_a^b [(p(t) - \mu)(h')^2 + qh^2] dt$

$\mu_0 := \min_{t \in [a, b]} p(t) > 0$ в силу усиленного условия Лежандра.

$\mu \in (-\mu_0, \mu_0)$

Если D_μ положительно определена при некотором $\mu \in (0, \mu_0)$, то неравенство (3.3.1) очевидно.

$$((p - \mu)h')' = qh$$

$$h'' + \frac{p'}{p - \mu}h' - \frac{q}{p - \mu}h = 0, \quad \mu \in (-\mu_0, \mu_0)$$

$h(a) = 0, h'(a) = 1$

$h(t, \mu)$ – решение этой задачи;

$h(t, 0) = h_0(t)$

<-!-РИСУНОК!->

Докажем, что $\exists \mu > 0 : h(t, \mu) > 0$ на $(a, b]$.

$h(t, \mu)$ и $h'(t, \mu)$ непрерывны на $[a, b] \times [-\mu_1, \mu_1]$, $\mu_1 < \mu_0$

(Теорема о непрерывной зависимости из ДУ: линейное уравнение второго порядка, коэффициенты непрерывны)

$$\frac{h_0(t)}{t-a} \text{ равна 1 при } t = a : \frac{h_0(t) - h_0(a)}{t-a} \xrightarrow[t \rightarrow a+0]{} \underbrace{h'(a)}_{=1}$$

<-!-РИСУНОК!->

$\frac{h(t, \mu)}{t-a}$ равна 1 при $t = a$

Докажем, что $\exists \mu > 0 : \frac{h(t, \mu)}{t-a} > 0$ на $[a, b]$.

От противного. $\exists \mu_k \rightarrow +0, \exists t_k \in [a, b] :$

$$\frac{h(t_k, \mu_k)}{t_k - a} \leq 0 \quad (3.3.2)$$

$t_k \rightarrow t_*$ (или подпоследовательность). Покажем, что $t_* \neq 0$ (вообще говоря, $t_* \in [a, b]$).

Пусть $t_k \rightarrow a$, тогда $\frac{h(t_k, \mu_k)}{t_k - a} = \frac{h(t_k, \mu_k) - h(a, \mu_k)}{t_k - a} = h'(a + \vartheta_k(t_k - a), \mu_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

(в этом переходе мы используем непрерывность по совокупности переменных)

$\xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} h'(a, 0) = h'_0(a) = 1$, что противоречит (3.3.2).

$t_k \rightarrow t_*, t_* \neq a, t_* \in (a, b]$

Переходим к пределу в (3.3.2): $\frac{h(t_*, 0)}{t_* - a} \leq 0 \Rightarrow h(t_*, 0) \leq a \Leftrightarrow h_0(t_*) \leq 0$, что противоречит усиленному условию Якоби (см. теорему 3.3.1).

Доказано $\exists \mu > 0 : \frac{h(t, \mu)}{t-a} \text{ на } [a, b] \Rightarrow h(t, \mu) > 0 \text{ на } (a, b] \Rightarrow D_\mu \text{ положительно определена} \Rightarrow (3.3.1)$

Что и требовалось доказать.

Теорема 3.3.3 x_* — решение квадратичной вариационной задачи, выполнены условия Якоби $\Rightarrow Q(x_* + h) \geq Q(x_*) + \mu \int_a^b (h')^2 dt \forall h \in C_0^1[a, b] (\exists \mu > 0)$

Доказательство.

I вариант:

$$Q(x_* + h) = Q(x_*) + \underbrace{l(x_*, h)}_{=0} + D(h) \geq Q(x_*) + \mu \int_a^b (h')^2 dt$$

x_* — единственное решение $Q(x_* + h) = Q(x_*) \Rightarrow D(h) = 0 \Rightarrow h = 0$

II вариант:

$$\int_a^b (h')^2 dt = 0 \Rightarrow h' \equiv 0 \Rightarrow h = const, \text{ а так как еще } h(a) = h(b) = 0 \Rightarrow h \equiv 0$$

Что и требовалось доказать.

3.4 Схема решения квадратичной вариационной задачи

$$Q(x) := \int_a^b (p(x')^2 + qx^2 - 2fx) dt \rightarrow \inf$$

$x(a) = A; x(b) = B; x \in C^1[a, b]$
 $q \in C[a, b], p \in C^1[a, b]$
 $p(t) > 0$ на $[a, b]$

1. $-(ph')' = qh$
 $h(a) = 0, h'(a) = 1$
 решение $h_0(t)$
2. если $\exists \xi \in (a, b) : h_0(\xi) = 0$, то $\inf Q(x) = -\infty$
 при выполнении условия Якоби переходим к следующему пункту.
3. $-(ph')' + qx = f$
 $x(a) = A, x(b) = B$
 $x*(t)$ — решение
4. Если $h_0(b) > 0$, то x_* — единственное решение
 Если $h_0(b) = 0$, то $x(t) = x_*(t) + \lambda h_0(t) \forall \lambda \in \mathbb{R}$ — решение

Пример 3.4.1 $Q(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((x')^2 - x^2) dt \rightarrow \inf$

$x(0) = 0, x(\frac{\pi}{2}) = 1$
 $p(t) \equiv 1, q(t) \equiv -1, f(t) \equiv 0$
 $h'' = -h \iff hh'' + h = 0$
 $h(0) = 0, h'(0) = 1$
 $h(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$
 $h_0(t) = \sin t$
 $h_0(t) > 0$ на $(0, \frac{\pi}{2}]$
 $x'' + x = 0, x(0) = 0, x(\frac{\pi}{2}) = 1$

Задача Штурма-Лиувилля

$x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$
 $x(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$
 $x(\frac{\pi}{2}) = 1 \Rightarrow c_2 = 1$
 $x_*(t) = \sin t$
 $h_0(\pi/2) > 0 \Rightarrow x_*$ — единственное решение

Пример 3.4.2 $\frac{\pi}{2} \mapsto \pi$

$Q(x) := \int_0^\pi ((x')^2 - x^2) dt \rightarrow \inf$
 $x(0) = 0, x(\pi) = 1$
 $h_0(t) = \sin t, h_0(t) > 0$ на $(0, \pi)$
 $x'' + x = 0, x(0) = 0, x(\pi) = 1$
 $x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$
 $x(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$
 $x(\pi) = 1 \Rightarrow c_2 \sin \pi = 1$
не имеет решений.

Задача

13* (решение есть на сайте лектора)

Доказать для рассматриваемого случая, что $\inf(Q(x)) = -\infty$

Пример 3.4.3 $Q(x) := \int_0^\pi ((x')^2 - x^2) dt \rightarrow \inf$

$x(0) = 0, x(\pi) = 0$
 $x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$
 $x(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$
 $x(\pi) = 0 \Rightarrow c_2 \sin \pi = 0 \Rightarrow c_2 \in \mathbb{R}$
 $x_*(t) \equiv 0 (c_2 = 0), x(t) = c_2 \sin t$
 $h_0(\pi) = 0 \Rightarrow x(t) = x_*(t) + \lambda h_0(t) = \lambda \sin t \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Задачи

14 $Q(x) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((x')^2 - x^2 + 4x \cos t) dt \rightarrow \inf$
 $x(0) = x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

15 $Q(x) := \int_{-1}^2 ((x')^2 + t^2 x') dt \rightarrow \inf$
 $x(-1) = 1, x(2) = 4$

3.5 Нелинейная вариационная задача. Уравнение Эйлера

$$J(x) := \int_a^b F(t, x(t), x'(t)) dt \rightarrow \inf$$

$$x(a) = A, x(b) = B, x \in C^1[a, b]$$

$F \in C^2(U)$, $U \subset \mathbb{R}^3$ — открытое связное.

$$x \in C[a, b] : z(x) = \{(t, x(t), x'(t)) : t \in [a, b]\}$$

$\Omega^0 = \{x \in C''[a, b] : z(x) \subset U\}$ — естественная область определения функционала J

$$J(x) \approx \sum_{j=1}^{n+1} F(t_j, x(t_j), x'(t_j)) h \rightarrow \inf$$

$$t_j = a + jh, j \in 0 : n+1, h = \frac{b-a}{n+1}$$

$$x_j = x(t_j), x'(t_j) \approx \frac{x(t_j) - x(t_{j-1})}{h}$$

$$\Phi(x) := \sum_{j=1}^{n+1} F(t_j, x(t_j), \frac{x(t_j) - x(t_{j-1})}{h}) \rightarrow \inf$$

$$x_0 = A, x_{n+1} = B, x = (x_1, \dots, x_n)$$

Необходимое условие оптимальности $\Phi'(x) = 0$, дифференцируем по x_j :

$$\Phi'_{x_j}(x) = F'_x(t_j, x(t_j), \frac{x(t_j) - x(t_{j-1})}{h}) + F'_{x'}(t_j, x(t_j), \frac{x(t_j) - x(t_{j-1})}{h}) \frac{1}{h} -$$

$$- F'_{x'}(t_{j+1}, x(t_{j+1}), \frac{x(t_{j+1}) - x(t_j)}{h}) \frac{1}{h}, j \in 1 : n$$

$$F'_x(t_j, x(t_j), x'(t_j)) - \frac{1}{h} (F'_{x'}(t_{j+1}, x(t_{j+1}), x'(t_{j+1})) - F'_{x'}(t_j, x(t_j), x'(t_j))) = 0$$

$$\varphi(t) := F'_{x'}(t_j, x(t_j), x'(t_j))$$

$$F'_x(t_j, x(t_j), x'(t_j)) - \frac{\varphi(t_j+h) - \varphi(t_j)}{h} = 0, j \in 1 : n$$

Фиксируем $t \in [a, b]$ и $\exists t_{j_n} : t_{j_n} \leq t \leq t_{j_{n+1}}$

Переходим к пределу при $n \rightarrow \infty$:

$$F'_x(t, x(t), x'(t)) - \frac{d}{dt} F'_{x'}(t, x(t), x'(t)) = 0, t \in [a, b]$$

$$x(a) = A, x(b) = B$$

Переходим к пределу в формуле для графика Φ' .

$J'(x) = -\frac{d}{dt} (F'_{x'}(t, x, x')) + F'_x(t, x, x')$ называется вариационной производной функционала J в точке x ($J'(x, t)$)

$$Q(x) := \int_a^b (p(x')^2 + qx^2 - 2fx) dt$$

$$F(t, x, x') = p(x')^2 + qx^2 - 2fx$$

$$F'_x = 2qx - 2f$$

$$f'_{x'} = 2px'$$

Вариационная производная

$$Q'(x) = -\frac{d}{dt} (2px') + (2qx - 2f) = 2(-p(x')' + qx - f) = 2(\mathbb{L}(x) - f)$$

Уравнение Эйлера: $J'(x, t) = 0, t \in [a, b]$

$$Q : \mathbb{L}(x) - f = 0$$

Для Q уравнение Эйлера = уравнение Штурма-Лиувилля.

3.6 Первый и второй дифференциалы интегрального функционала

Задача

16* Исследовать зависимость решения от параметра ε :

$$Q(x) = \int_0^1 [\varepsilon(x')^2 - x^2] dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[0, 1], \quad \varepsilon > 0$$

$$J(x) = \int_a^b F(t, x, x') dt, \quad x \in C^1[a, b]$$

$F \in C^2(U)$, $U \subset \mathbb{R}^3$ открытое связное.

$\Omega^0 = \{x \in C^1[a, b] \mid Z(x) \subset U\}$ — естественная область определения функционала J .

$$\begin{aligned} Z(x) &= \{(t, x(t), x'(t)) \mid t \in [a, b]\} \\ x \in C^1[a, b] \quad \|x\|_1 &= \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)| \end{aligned}$$

Теорема 3.6.1 Ω^0 открыто в $C^1[a, b]$.

Доказательство.

$\forall x_0 \in \Omega^0 \exists \delta_0 > 0 : x_0 + h \in \Omega^0$ при $\|h\|_1 \leq \delta_0$

$Z_0 = Z(x_0)$, $\delta > 0$ фиксировано.

$Z_\delta = \{(\tau, u, v) \mid \exists t \in [a, b] \quad |\tau - t| + |u - x_0(t)| + |v - x'_0(t)| \leq \delta\}$

Лемма 3.6.1 Z_δ ограничено и замкнуто (компактно).

Доказательство.

$|\tau| \leq |t| + \delta \quad |u| \leq |x_0(t)| + \delta \quad |v| \leq |x'_0(t)| + \delta$ при некотором $t \in [a, b]$,

$x_0(t), x'_0(t)$ ограничены на $[a, b] \Rightarrow$ ограниченность Z_δ .

$(\tau_k, u_k, v_k) \rightarrow (\tau_*, u_*, v_*)$

$\forall k \exists t_k \in [a, b] : |\tau_k - t_k| + |u_k - x_0(t_k)| + |v_k - x'_0(t_k)| \leq \delta$

$t_k \rightarrow t_* \in [a, b]$ в пределе $|\tau_* - t_*| + |u_* - x_0(t_*)| + |v_* - x'_0(t_*)| \leq \delta \Rightarrow$

$(\tau_*, u_*, v_*) \in Z_\delta$

Что и требовалось доказать.

Лемма 3.6.2 $\exists \delta_0 > 0 \quad Z_{\delta_0} \subset U$.

Доказательство.

От противного.

$\forall \delta_k > 0 \exists t_k \in [a, b] : (\tau_k, u_k, v_k) \in Z_{\delta_k}$ с соотв. t_k $(\tau_k, u_k, v_k) \notin U$

$\delta_k \rightarrow 0+ \quad |\tau_k - t_k| + |u_k - x_0(t_k)| + |v_k - x'_0(t_k)| \leq \delta_k$

(t_k, τ_k, u_k, v_k) ограничена

Считаем, что $(t_k, \tau_k, u_k, v_k) \rightarrow (t_*, \tau_*, u_*, v_*)$

Переходим в неравенстве к пределу

$|\tau_* - t_*| + |u_* - x_0(t_*)| + |v_* - x'_0(t_*)| = 0 \Rightarrow$

$(\tau_*, u_*, v_*) = (t_*, x_0(t_*), x'_0(t_*)) \in Z_0 \subset U$.

Но U открыто $\Rightarrow (\tau_*, u_*, v_*)$ содержится в U вместе с окрестностью, однако

$(t_k, u_k, v_k) \rightarrow (\tau_*, u_*, v_*) \quad (t_k, u_k, v_k) \notin U$ по предположению.

Противоречие.

Что и требовалось доказать.

$x_0 + h \in \Omega^0$ при $\|h\|_1 \leq \delta_0$ (δ_0 из Леммы 2).

Докажем, что $Z(x_0 + h) \subset U$.

Покажем, что $Z(x_0 + h) \subset Z_{\delta_0} (\subset U)$.

Рассмотрим элемент из $Z(x_0 + h)$: $(t, x_0(t) + h(t), x'_0(t) + h'(t))$

Рассмотрим $(t, x_0(t), x'_0(t)) \in Z_0$

Расстояние l_1 между ними: $\delta_0 \geq l_1 \geq |h(t)| + |h'(t)| \quad \|h\|_1 \leq \delta_0$

По определению $(t, x_0(t) + h(t), x'_0(t) + h'(t)) \in Z_{\delta_0}$

Что и требовалось доказать.

$$J(x) = \int_a^b F(t, x(t), x'(t)) dt$$

Ω^0 — естественная область определения, $x_0 \in \Omega^0$.

Как известно, $\exists \delta_0 > 0 \quad x_0 + h \in \Omega^0$ при $\|h\|_1 \leq \delta_0$

Покажем, что

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = l(h) + o(\|h\|_1),$$

где l — линейный функционал на $C^1[a, b]$.

$$J(x_0 + h) - J(x) = \int_a^b H(t) dt$$

$$H(t) = \tilde{F}'_x h + \tilde{F}'_{x'} h' = (F'_x h + F'_{x'} h') + [(\tilde{F}'_x - F'_x)h + (\tilde{F}'_{x'} - F'_{x'})h] = H_1(t) + G_1(t)$$

Аргументы у $\tilde{F}'_x, \tilde{F}'_{x'}$ $(t, x_0 + \vartheta h, x'_0 + \vartheta h')$.

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = \int_a^b H_1(t) dt + \int_a^b G_1(t) dt = l(h) + \omega_1(h)$$

$$l(h) = \int_a^b (F'_x h + F'_{x'} h') dt$$

Это линейный функционал на $C^1[a, b]$ ($l(\alpha h) = \alpha l(h)$)

Покажем, что $\omega_1(h) = o(\|h\|_1)$

Z_{δ_0} ограничен и замкнут, поэтому по теореме Кантора $F'_x, F'_{x'}$ равномерно-

непрерывны на Z_{δ_0}

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta \in (0, \frac{\delta_0}{2}] :$

$$|F'_x(t, x_0(t) + u, x'_0(t) + v - F'_x(t, x_0(t), x'_0(t)))| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$$

$$|F'_{x'}(t, x_0(t) + u, x'_0(t) + v - F'_{x'}(t, x_0(t), x'_0(t)))| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$$

$|u|, |v| < \delta$ при всех $t \in [a, b]$ ($|u| + |v| \leq \delta_0$ и приращение находит за Z_{δ_0}).

$$|\omega_1(h)| \leq \int_a^b |G_1(t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b (|h| + |h'|) dt \leq \varepsilon \|h\|_1,$$

т.е. $\omega_1(h) = o(\|h\|_1)$.

$l(h)$ называется первым дифференциалом функционала J в точке x_0 , обозначается $dJ(x_0; h)$, т.е. доказано существование представления.

Покажем единственность:

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = l(h) + o(\|h\|_1)$$

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = l_1(h) + o(\|h\|_1)$$

Тогда $l(h) - l_1(h) = o(\|h\|_1)$

$x_0 + \lambda h \in Z_{\delta_0}$ при малых $\lambda > 0$.

$$l(\lambda h) - l_1(\lambda h) = o(\|\lambda h\|_1)$$

$$l(h) - l_1(h) = \frac{o(\|\lambda h\|_1)}{\lambda \|h\|_1}, \quad \lambda > 0$$

$$\lambda \rightarrow 0+ \quad l(h) = l_1(h) \quad \forall h \in C^1[a, b]$$

Теорема 3.6.2 J дифференцируем в каждой точке $x_0 \in \Omega^0$, при этом

$$dJ(x_0; h) = \int_a^b (F'_x h + F'_{x'}) dt$$

$$J(x_0 + h) = J(x_0) + dJ(x_0; h) + o(\|h\|_1)$$

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = dJ(x_0; h) + \frac{1}{2} D(h) + o(\|h\|_1^2),$$

где $D(x)$ — квадратичная форма в $C^1[a, b]$.

$D(h) = d^2 J(x_0; h)$ второй дифференциал.

Фиксируем $t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} H(t) &= (F''_x h + F'_{x'} h') + \frac{1}{2} (\tilde{F}''_{xx} h^2 + 2\tilde{F}''_{xx'} h h' + \tilde{F}''_{x'x'} (h')^2) = \\ &= (F'_x h + F'_{x'} h') + \frac{1}{2} (F''_{xx} h^2 + 2F''_{xx'} h h' + F''_{x'x'} (h')^2) + \\ &+ \frac{1}{2} [(\tilde{F}''_{xx} - F''_{xx}) h^2 + 2(\tilde{F}''_{xx'} - F''_{xx'}) h h' + (\tilde{F}''_{x'x'} - F''_{x'x'}) (h')^2] = \\ &= H_1(t) + H_2(t) + G_2(t) \\ D(h) &= \int_a^b [F''_{xx} h^2 + 2F''_{xx'} h h' + F''_{x'x'} (h')^2] dt \end{aligned}$$

D квадратичная форма на $C^1[a, b]$ ($D(\lambda h) = \lambda^2 D(h)$).

$$|\omega_2(x)| = \int_a^b |G_2(t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b (|h|^2 + 2|h| \cdot |h'| + |h'|^2) dt \leq \varepsilon (\|h\|_1^2)$$

(ε и δ как в случае первого дифференциала).

$$\omega_2(h) = o(\|h\|_1^2)$$

$$J(x), x_0 \in \Omega^0$$

$$dJ(x_0, h) = \int_a^b [F'_x h + F'_{x'} h'] dt, \quad h \in C^1[a, b]$$

$$J(x_0 + h) - J(x_0) = dJ(x_0, h) + o(\|h\|_1)$$

$$J(x_0 + h) = J(x_0) + dJ(x_0, h) + \frac{1}{2}D(h) + o(\|h\|_1^2), \quad \|h\|_1 \leq \delta_0$$

Единственность D :

Пусть имеется еще одна квадр. форма D_1 : $D(h) - D_1(h) = o(\|h\|_1^2)$. Фиксируем $h_0 \in C^1[a, b] : h_0 \not\equiv 0$

$$D(\lambda h_0) - D_1(\lambda h_0) = o(\|\lambda h_0\|_1^2)$$

$$\Rightarrow D(h_0) - D_1(h_0) = \underbrace{\frac{o(\|\lambda h_0\|_1^2)}{\lambda^2 \|h_0\|_1^2}}_{\rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow 0+)} \|h_0\|_1^2, \quad \lambda \geq 0$$

$$\Rightarrow D(h_0) = D_1(h_0) \quad \forall h_0 \in C^1[a, b]$$

$$d^2 J(x_0, h) = \int_a^b [F''_{xx} h^2 + 2F''_{xx'} h h' + F''_{x'x'} (h')^2] dt$$

Теорема 3.6.3 $J(x)$ в каждой точке $x_0 \in \Omega^0$ дважды дифференцируемо, при этом для второго дифференциала верна формула, приведенная выше.

3.7 Необходимые условия оптимальности

$$J(x) = \int_a^b F(t, x, x') dt \rightarrow \inf$$

$$x(a) = A, \quad x(b) = B, \quad x \in C^1[a, b],$$

$$F \in C^2(U), \quad \Omega^0 \subset C^1[a, b] — открыто в $C^1[a, b]$$$

Ω — множество планов. $x_* \in \Omega$ — точка локального минимума.

$$J(x_* + h) \geq J(x_*) \quad \forall h \in C_0^1[a, b], \quad \|h\|_1 \leq \rho$$

Теорема 3.7.1 $x_* \in \Omega$ — точка локального минимума. Тогда

$$dJ(x_*, h) = 0 \tag{3.7.1}$$

$$d^2J(x_*, h) \geq 0 \tag{3.7.2}$$

при всех $h \in C_0^1[a, b]$

(3.7.1) — необходимое условие минимума I порядка.

(3.7.2) — необходимое условие минимума II порядка.

Доказательство.

Фиксируем $h_0 \in C_0^1[a, b]$, $h_0 \neq 0$ (иначе (3.7.1) и (3.7.2) тривиальны.)

$$0 \leq J(x_* + \lambda h_0) - J(x_*) = dJ(x_*, \lambda h_0) + o(\|\lambda h_0\|_1)$$

$$\Rightarrow dJ(x_*, h_0) + \underbrace{\frac{o(\|\lambda h_0\|_1)}{\lambda \|h_0\|_1}}_{\rightarrow 0 (\lambda \rightarrow 0)} \|h_0\|_1 \geq 0$$

$$\Rightarrow dJ(x_*, h_0) \geq 0$$

$$-h_0 \in C_0^1[a, b]$$

$$dJ(x_*, -h_0) \geq 0 \Rightarrow dJ(x_*, h_0) \leq 0$$

Получили $dJ(x_*, h_0) = 0$

$$0 \leq J(x_* + \lambda h_0) - J(x_*) = \frac{1}{2} d^2J(x_*, \lambda h_0) + o(\|\lambda h_0\|_1^2) \quad (\lambda > 0, \text{ мал.})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} d^2J(x_*, \lambda h_0) + \underbrace{\frac{o(\|\lambda h_0\|_1^2)}{\lambda^2 \|h_0\|_1^2}}_{\rightarrow 0 (\lambda \rightarrow 0+)} \|h_0\|_1^2 \geq 0$$

$$d^2J(x_*, h_0) \geq 0$$

Что и требовалось доказать.

$$dJ(x_*, h) = \int_a^b [F'_x h + F'_{x'} h'] dt, \quad h \in C_0^1[a, b]$$

Лемма 3.7.1

$$\begin{aligned} dJ(x_*, h) = 0, \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow F'_{x'}(t, x_*(t), x'_*(t)) \in C^1[a, b] \\ u \frac{d}{dt} F'_{x'} = F'_x \text{ на } [a, b] \end{aligned}$$

Доказательство.

Необходимость следует из основной леммы вариационного исчисления 3.1.3:

$$u = F'_{x'}, \quad v = F'_x \quad [u \in C^1[a, b], u' = v]$$

Достаточность:

$$\begin{aligned} \int_a^b F'_{x'} h' dt &= \int_a^b F'_{x'} dh = \underbrace{F'_{x'} h|_a^b}_{=0 \text{ (доп. вар.)}} - \int_a^b \frac{d}{dt} F'_{x'} h dt \\ dJ(x_*, h) &= \int_a^b \underbrace{\left(F'_x - \frac{d}{dt} F'_{x'} \right)}_{=0} h dt = 0 \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Теорема 3.7.2 $x_* \in \Omega$ — точка локального минимума вариационной задачи, тогда $F'_{x'}(t, x_*, x'_*) \in C^1[a, b]$ и x_* удовлетворяет

$$F'_x(t, x, x') - \frac{d}{dt} F'_{x'}(t, x, x') = 0$$

на $[a, b]$.

$$x(a) = A, \quad x(b) = B$$

Доказательство.

Очевидно из леммы 3.7.1.

Что и требовалось доказать.

Любая интегральная кривая наз. **экстремалью**. Экстремаль, удовлетворяющая краевым условиям, наз. стационарной кривой.

Пример 3.7.1

$$\begin{aligned} J(x) &:= \int_{-1}^1 [(x')^3 + 24tx] dt \rightarrow \inf \\ x(-1) &= -1, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[-1, 1] \end{aligned}$$

Найти стационарную кривую.

$$\begin{aligned} F'_x &= 24t, \quad F'_{x'} = 3(x')^2, \quad F''_{x'x'} = 6x' \\ 3 \frac{d}{dt} (x')^2 &= 24t, \quad \frac{d}{dt} (x')^2 = 8t \\ (x')^2 &= 4t^2 + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x(t) &= t^2 \text{ npu } c = 0 \\
x(t) &= -t^2 \\
x_*(t) &= \begin{cases} t^2, & \text{npu } t \geq 0 \\ -t^2, & \text{npu } t \leq 0 \end{cases} \\
&<\text{-!-PICTHOK-!-}> \\
x'_*(t) &= \begin{cases} 2t, & t \geq 0 \\ -2t, & t \leq 0 \end{cases}, \quad x_* \in C^1[-1, 1] \\
\frac{d}{dt}(x'_*)^2 &= 8t
\end{aligned}$$

— следовательно, x_* — стационарная кривая.

$$x''_* = \begin{cases} 2, & t \geq 0 \\ -2, & t \leq 0 \end{cases}$$

Формально продифференцируем $F'_{x'}$

$$F'_x - F''_{x't} - F''_{x'x}x' - F''_{x'x'}x'' = 0$$

Теорема 3.7.3 [Гильберта]

Пусть x_0 — экстремаль.

$$\begin{aligned}
T &= \{t \in [a, b] | F''_{x'x'}(t, x_0, x'_0) \neq 0\} \\
&\Rightarrow x_0 \in C^2(T)
\end{aligned}$$

Доказательство.

$$\frac{d}{dt}F'_{x'} = F'_x \text{ на } x_0$$

Фиксируем $t_0 \in T$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\Delta t} [F'_{x'}(t_0 + \Delta t, x_0(t_0 + \Delta t), x'_0(t_0 + \Delta t)) - F'_{x'}(t_0, x_0(t_0), x'_0(t_0))] &\rightarrow \\
&\rightarrow F'_x(t_0, x_0(t_0), x'_0(t_0))
\end{aligned}$$

$$\tilde{F}''_{x't} + \tilde{F}''_{x'x} \frac{x_0(t_0 + \Delta t) - x_0(t_0)}{\Delta t} + \tilde{F}''_{x'x'} \frac{x'_0(t_0 + \Delta t) - x'_0(t_0)}{\Delta t}$$

Аргумент \tilde{F} : $(t_0 + \vartheta \Delta t, x_0(t_0) + \vartheta(x_0(t_0 + \Delta t) - x_0(t_0)), x'_0(t_0) + \vartheta(x'_0(t_0 + \Delta t) - x'_0(t_0)))$

$$\frac{x'_0(t_0 + \Delta t) - x'_0(t_0)}{\Delta t} = \frac{1}{\tilde{F}''_{x'x'}} \left[\tilde{F}''_{x'x} \frac{x'_0(t_0 + \Delta t) - x'_0(t_0)}{\Delta t} + \tilde{F}''_{x'x'} \frac{x_0(t_0 + \Delta t) - x_0(t_0)}{\Delta t} + \tilde{F}''_{x't} \right]$$

$\Delta t \rightarrow 0$

$$x''_0(t_0) = \tilde{F}''_{x'x'} [F'_x - F''_{x'x}x'_0(t_0) - F''_{x't}]$$

(t, x_0, x'_0)

Правая часть непрерывна на $T \Rightarrow x_0 \in C^2(T)$

Что и требовалось доказать.

Следствие 3.7.1 Если x_0 — экстремаль, и на ней $F''_{x'x'} \neq 0$ при $t \in [a, b]$, то $x_0 \in C^2[a, b]$

Определение 3.7.1 Если $F''_{yy}(t, x, y) = 0$ на всем U , то функционал J наз. регулярным. Положительно регулярен, если $F''_{yy}(t, x, y) > 0$ на U , и отрицательно регулярен, если $F''_{yy}(t, x, y) < 0$ на U .

Задачи

17*

$$\int_{-1}^1 \{x^2(1-x')^2\} dt \rightarrow \inf$$

$$x(-1) = -1, \quad x(1) = 1, \quad x \in C^1[-1, 1]$$

Доказать, что задача не имеет решения; найти \inf .

18

$$J(x) = \int_0^1 \{(x')^2(1-x^2)\} dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = x(1) = 0$$

Доказать, что кривая $x_0(t) \equiv 0$ является точкой локального минимума, однако $\inf J(x) = -\infty$.

$$x \in C^2[a, b]$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(F - x' F'_{x'} \right) &= F'_t + F'_x x' + F'_{x'} x'' - x'' F'_{x'} - x' \frac{d}{dt} F'_{x'} = \\ &= F'_t + x' \left(F'_x - \frac{d}{dt} F'_{x'} \right) \\ \frac{d}{dt} \left(F - x' F'_{x'} \right) &\equiv F'_t \\ x(a) = A, \quad x(b) = B \end{aligned}$$

Допустим, что оно имеет решение $x_0 \in C^2[a, b]$, $x'_0(t) \neq 0$, за исключением конечного числа точек.

Тогда x_0 — стационарная кривая

$$\left(x' \left(F'_x - \frac{d}{dt} F'_{x'} \right) = 0 \right)$$

Следствие 3.7.2 Если $F = F(x, x')$, то следует решать краевую задачу

$$F - x' F'_{x'} \equiv \text{const}$$

$$x(a) = A, \quad x(b) = B$$

Если решение существует, $\in C^2[a, b]$ и его производная обращается в 0 разве лишь в конечном числе точек, то это решение — стационарная кривая.

x_* — стационарная кривая и

$$d^2 J(x_0, h) = D(h) = \int_a^b [p(h')^2 + 2uhh' + vh^2] dt \geq 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b],$$

где $p = F''_{x'x'}$, $u = F''_{xx'}$, $v = F''_{xx}$.

Предположим, что $F \in C^3(U)$, $p(t) = F''_{x'x'}(t, x_*(t), x'_*(t)) > 0$ на $[a, b]$

По теореме Гильберта $x_* \in C^2[a, b] \Rightarrow p, u, v \in C^1[a, b]$

Приведем $D(h)$ к каноническому виду:

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b uhh' dt &\underset{h \in C_0^1[a, b]}{=} \int_b^a u dh^2 = \underbrace{(uh^2)|_a^b}_{=0} - \int_a^b u'h^2 dt \\ D(h) &= \int_a^b [p(h')^2 + (v - u')h^2] dt \\ g &= v - u' \end{aligned}$$

$D(h) \geq 0$ на $C_0^1[a, b] \Rightarrow$ главное решение уравнения Якоби положительно на (a, b)

$$(ph')' = gh \quad (g = v - u')$$

$$h(a) = 0, \quad h'(a) = 1$$

Теорема 3.7.4

$$F \in C^3(U)$$

x_* — точка лок. min. в вариационной задаче и на ней $p(t) > 0$ на $[a, b] \Rightarrow$

x_* — стационарная кривая и $h_0(t) > 0$ на (a, b) .

Задача

19

$$\begin{aligned} dJ(x^0, h) &\geq 0 \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \implies \\ \implies p(t) &= \underbrace{F''_{x'x'}(t, x_0(t), x'_0(t))}_{\text{условие Лежандра}} \geq 0 \quad \text{на } [a, b] \end{aligned}$$

3.8 Достаточные условия строгого локального минимума

$$J(x) := \int_a^b F(t, x, x') dt \rightarrow \inf \quad (3.8.1)$$

$$x(a) = A, \quad x(b) = B, \quad x \in C^1[a, b]$$

$$F \in C^3(U)$$

Теорема 3.8.1 Пусть

- 1 x_0 — стационарная кривая (удовлетворяет уравнению Эйлера и краевым условиям).
 - 2 На ней выполнено усиленное условие Лежандра $p(t) > 0$ на $[a, b]$ ($p(t) = F''_{x'x'}(t, x_0(t), x'_0(t))$).
 - 3 На ней выполнено усиленное условие Якоби $h_0(t) > 0$ на $(a, b]$
- [$(ph')' = qh$, $h(a) = 0$, $h'(a) = 1$, $g = v - u'$, $v = F''_{xx}$, $u = F''_{xx'}$]
- $\implies x_0$ — точка строгого локального минимума (для (3.8.1))

$$J(x_0 + h) > J(x_0) \quad \forall h \in C_0^1[a, b], \quad h \not\equiv 0, \|h\|_1 \leq \rho$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} J(x_0 + h) - J(x_0) &= \underbrace{dJ(x_0, h)}_{=0 \text{ по условию 1}} + \frac{1}{2} d^2 J(x_0, h) + \omega_2(h) = \\ &= \frac{1}{2} d^2 y(x_0, h) + \omega_2(h) \geq \frac{1}{2} d^2 y(x_0, h) - |\omega_2(h)| \end{aligned}$$

$d^2 J(x_0, h) = D(h) = (D(h)$ положительно определена по усл. 2,3)

$$= \int_a^b (p(h')^2 + gh^2) dt \geq \mu \int_a^b (h')^2 dt \quad \forall h \in C_0^1[a, b] \quad (\exists \mu > 0)$$

Напомним, что $|\omega_2(h)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b ((h')^2 + 2|h'h| + h^2) dt$ при $\|h\|_1 \leq \delta$

$$h \in C_0^1[a, b]$$

$$h^2(t) = \left(\int_a^t 1 \cdot h'(\tau) d\tau \right)^2 \leq \int_a^t 1^2 dt \int_a^t (h')^2 dt \leq (b-a) \int_a^b (h')^2 dt$$

$$\int_a^b h^2 dt \leq (b-a)^2 \int_a^b (h')^2 dt$$

$$\int_a^b |hh'| dt \leq \left(\int_a^b h^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b (h')^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq (b-a) \int_a^b (h')^2 dt$$

$$\int_a^b ((h')^2 + 2|h'h| + h^2) dt \leq (1 + 2(b-a) + (b-a)^2) \int_a^b (h')^2 dt$$

$|\omega_2(h)| \leq \frac{\varepsilon(b-a+1)^2}{b-a} \int_a^b (h')^2 dt$ при $\|h\|_1 \leq \delta$
Возьмем $\varepsilon = \frac{\mu}{4} \frac{b-a}{(b-a+1)^2}$

$$|\omega_2(h)| \leq \frac{\mu}{4} \int_a^b (h')^2 dt$$

$$\begin{aligned} J(x_0 + h) - J(x_0) &\geq \frac{\mu}{2} \int_a^b (h')^2 dt - \frac{\mu}{4} \int_a^b (h')^2 dt = \\ &= \frac{\mu}{4} \int_a^b (h')^2 dt \text{ при } \|h\|_1 \leq \delta \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

3.9 Параметрический метод построения главного решения уравнения Якоби

x_0 — стационарная кривая

$$\alpha_0 = x'_0(a)$$

$$\begin{aligned} F'_x(t, x(t, \alpha), x'_t(t, \alpha)) - \frac{d}{dt}(F'_x(t, x(t, \alpha), x'_t(t, \alpha))) &= 0 \text{ на } [a, b] \\ x(a, \alpha) = A \quad , \quad x'_t(a, \alpha) &= \alpha_0 \end{aligned} \tag{3.9.1}$$

$x(t, \alpha)$ — параметрическое поле экстремалей
 $x(t, \alpha_0) = x_0(t)$
(Стационарную кривую погрузим в поле экстремалей)

Пусть $x(t, \alpha)$ трижды дифференцируема на $[a, b] \times (\alpha_0 - \varepsilon, \alpha_0 + \varepsilon)$
Дифференцируем (3.9.1) по α

$$x'_\alpha(a, \alpha) = 0, \quad x''_{\alpha t}(a, \alpha) = 1 \tag{3.9.2}$$

Дифференцируем уравнение Эйлера по α и подставляем $\alpha = \alpha_0$

$$F''_{xx}x'_\alpha(t, \alpha_0) + F''_{xx}x''_{t\alpha}(t, \alpha_0) - \frac{d}{dt}[F''_{xx}x'x_\alpha(t, \alpha_0) + F''_{xx}x'x''_{t\alpha}(t, \alpha_0)] = 0$$

Аргумент у $F' = (t, x_0, x'_0)$ $[x(t, \alpha_0) = x_0(t)]$

$$vx'_\alpha + \underline{ux''_{t\alpha}} - \underline{ux''_{t\alpha}} - u'x'_\alpha - \frac{d}{dt}(px''_{t\alpha}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(px''_{t\alpha}) = (v - u')x'_\alpha$$

$h_0(t) = x'_\alpha(t, \alpha_0)$ удовлетворяет уравнению Якоби

$h_0(a) = x'_\alpha(a, \alpha_0) = 0$ по (3.9.2)

$h'_0(a) = x''_{\alpha t}(a, \alpha_0) = 1$ по (3.9.2)

$h_0(t)$ — главное решение уравнения Якоби

x_* — стационарная кривая, выполнено усиленное условие Лежандра.

$$F'_x - \frac{d}{dt}F'_{x'} = 0 \quad x(a) = A \quad x'(a) = B$$

$$x(t, \alpha), \quad \alpha_0 = x'_*(a), \quad x(t, \alpha_0) = x_*(t)$$

$h_0(t) = x'_\alpha(t, \alpha_0)$ — главное решение уравнения Якоби.

Если $h_0(t) > 0$ на $[a, b]$, то x_* — точка строгого локального минимума.

Пример 3.9.1

$$J(x) := \int_0^1 \frac{x}{x'^2} dt \rightarrow \inf \quad x(0) = 1, \quad x(1) = 4, \quad x \in C^1[0, 1]$$

$y := x'$ $F = F(x, y) = \frac{x}{y^2}$ $U : y > 0, x > 0$
 $F'_y = \frac{-2x}{y^3}$ $F''_{yy} = \frac{6x}{y^4} > 0$ на U
 Функционал J — положительный регулярный (на всей кривой выполняется условие Лежандра).

Уравнение Эйлера: $F - x'F' - x' \equiv const$

$$\frac{x}{(x')^2} - x' \frac{-2x}{(x')^3} \equiv const$$

$$\frac{3x}{(x')^2} = \frac{3}{4a^2}, \quad a > 0$$

$$x' = 2a\sqrt{x}$$

$$\frac{dx}{2\sqrt{x}} = a \cdot dt$$

$$\sqrt{x} = at + b \quad x = (at + b)^2$$

$$x(0) = 1 \Rightarrow b^2 = 1 \Rightarrow b = 1 \text{ или } b = -1$$

$$x(1) = 4 \Rightarrow (a + b)^2 = 4 \Rightarrow a = 1 \text{ или } a = 3 \quad a > 0$$

$$x_*(t) = (t + 1)^2 \text{ — стационарная кривая.}$$

$$x_0(t) = (3t - 1)^2 \text{ — побочная кривая. } x_0(\frac{1}{3}) = 0$$

Усиленное условие Лежандра на x_* выполняется.
 $x = (at + b)^2$ — общее решение уравнения Эйлера.

$$x(0) = 1 \Rightarrow b^2 = 1 \quad x'(0) = \alpha \Rightarrow 2ab = \alpha \Rightarrow a = \frac{\alpha}{2b}$$

$$x(t, \alpha) = (\frac{\alpha}{2b}t + b)^2 = b^2(\frac{\alpha}{2b} + 1)^2 = (\frac{\alpha}{2}t + 1)^2$$

$$\alpha_0 = 2 \quad h_0(t) = x'_\alpha(t, \alpha_0) = 2\frac{t}{2}(\frac{\alpha}{2}t + 1)|_{\alpha=2} = t(t + 1)$$

$h_0(t) > 0$ на $(0, 1]$ — усиленное условие Якоби выполнено $\Rightarrow x_*$ — точка строгого локального минимума.

$$J(x_*) = \int_0^1 \frac{(t + 1)^2}{4(t + 1)^2} dt = \frac{1}{4} \quad J(x_0) = \int_0^1 \frac{(3t - 1)^2}{36(3t - 1)^2} dt = \frac{1}{36}$$

Задачи

20*

$$\int_0^1 (x')^2 x^2 dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 1, \quad x(1) = \sqrt{2}, \quad x \in C^1[0, 1]$$

21*

$$\int_0^1 [(x')^2 + 2p \cos x] dt \rightarrow \inf$$

$$x(0) = x(1) = 0, \quad x \in C^1[0, 1]$$

$p > 0$ – параметр

Найти $\sup p$: кривая $x_0(t) \equiv 0$ является точкой строгого локального минимума. (Задача Эйлера)

22

$$J(x) = \int_0^b \frac{dt}{x'} \rightarrow \inf$$

$$x(0) = 0, \quad x(b) = B, \quad x \in C^1[0, b], \quad b, B > 0$$

Найти точку строгого локального минимума.

3.10 Задача о брахистохроне

Найти кривую, по которой тяжелая материальная точка скатывалась бы за кратчайшее время.

$$P(x) = mg \cdot \sin \varphi = \frac{mg \cdot \operatorname{tg} \varphi}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}} = \frac{mg \cdot y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \quad \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Пусть V_0 — начальная скорость, dS — элемент дуги.

$$P = m \frac{dV}{dt} = m \frac{dV}{dS} \cdot \frac{dS}{dt} = mV \frac{dV}{dS}$$

$$\frac{gy'dS}{\sqrt{1 - (y')^2}} = V \cdot dV \Rightarrow 2gy'dx = dV^2 \Rightarrow 2gdy = dV^2$$

Интегрируем по $[0, x]$ ($y(0) = 0$, $2g\beta := V_0^2$, $\beta = \frac{V_0^2}{2g}$):

$$2g \cdot y(x) = V^2(x) - V^2(0) \Rightarrow 2g(y + \beta) = V^2 \Rightarrow V = \sqrt{2g} \cdot \sqrt{y + \beta}$$

$$\frac{dS}{dt} = \sqrt{2g} \cdot \sqrt{y + \beta} \Rightarrow dt = \frac{dS}{\sqrt{2g} \cdot \sqrt{y + \beta}} = \frac{\sqrt{1 + (y')^2} \cdot dx}{\sqrt{2g} \cdot \sqrt{y + \beta}}$$

Интегрируем по $[0, b]$ ($t(0) = 0$):

$$\begin{aligned} t(b) &= \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^b \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y + \beta} dx & T(y) &= t(b) \\ T(y) &:= \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^b \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y + \beta} dx \rightarrow \inf & (3.10.1) \end{aligned}$$

$$y(0) = 0, \quad y(b) = B, \quad x \in C^1[0, b]$$

T положительно регулярна.

$$z := y' \quad U : y > -\beta$$

$$F = F(y, z) = \frac{\sqrt{1 + z^2}}{y + \beta}$$

$$F'_z = \frac{z}{\sqrt{1 + z^2} \cdot \sqrt{y + \beta}} \quad F''_{zz} = \frac{\sqrt{1 + z^2} - z \frac{z}{\sqrt{1 + z^2}}}{(1 + z^2) \cdot \sqrt{y + \beta}} = \frac{1}{\sqrt{y + \beta} \cdot (1 + z^2)^{\frac{3}{2}}} > 0$$

Уравнение Эйлера (с понижением порядка)

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y + \beta}} - y' \frac{y'}{\sqrt{y + \beta} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} &\equiv \text{const} \\ \frac{1}{\sqrt{y + \beta} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2r}}, \quad r > 0 \quad y + \beta = \frac{2r}{1 + (y')^2} & (3.10.2) \end{aligned}$$

Пусть $y'(x) = \operatorname{ctg} \frac{1}{2}\vartheta(x)$ $\vartheta \in (0, 2\pi)$ $\vartheta \in C^1(0, 2\pi)$.

$$(3.10.2) \Rightarrow y + \beta = 2r \cdot \sin^2 \frac{\vartheta}{2} = r(1 - \cos \vartheta)$$

Дифференцируем по x :

$$\operatorname{ctg} \frac{\vartheta}{2} = r \cdot \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dx} \Rightarrow dx 2r \cdot \sin^2 \frac{\vartheta}{2} d\vartheta = r(1 - \cos \vartheta) d\vartheta \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x + \alpha = r(\vartheta - \sin \vartheta) \\ y + \beta = r(1 - \cos \vartheta) \end{cases} \quad \vartheta \in (0, 2\pi) \quad (3.10.3)$$

ϑ — независимый параметр.

Проверим (3.10.2):

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\vartheta} &= r(1 - \cos \vartheta) = 2r \cdot \sin^2 \frac{\vartheta}{2} & \frac{dy}{d\vartheta} &= 2r \cdot \sin \frac{\vartheta}{2} \cdot \cos \frac{\vartheta}{2} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos \frac{\vartheta}{2}}{\sin \frac{\vartheta}{2}} = \operatorname{ctg} \frac{\vartheta}{2} \\ \frac{2r}{1 + (y')^2} &= \frac{2r}{1 + \operatorname{ctg}^2 \frac{\vartheta}{2}} = 2r \cdot \sin^2 \frac{\vartheta}{2} = r(1 - \cos \vartheta) = y + \beta \end{aligned}$$

Параметры (3.10.3): α и r .

Решением задачи (3.10.1) является дуга кривой (3.10.3) $[\vartheta_0, \vartheta_1] \subset (0, 2\pi)$

$$y(0) = 0 : \begin{cases} \alpha = r(\vartheta_0 - \sin \vartheta_0) \\ \beta = r(1 - \cos \vartheta_0) \end{cases} \quad y(b) = B : \begin{cases} b + \alpha = r(\vartheta_1 - \sin \vartheta_1) \\ B + \beta = r(1 - \cos \vartheta_1) \end{cases}$$

Неизвестные: $r, \alpha, \vartheta_0, \vartheta_1$, система нелинейна.

Базовая кривая определяется условиями:

$$\begin{cases} x + \alpha = r(\vartheta - \sin \vartheta) \\ y + \beta = r(1 - \cos \vartheta) \end{cases} \quad \vartheta \in (0, 2\pi)$$

$$x = r(\vartheta - \sin \vartheta)$$

$$y = r(1 - \cos \vartheta)$$

<-!-РИСУНОК!->

$$|OP| = |\check{MP}| = r\vartheta$$

$$x = r\vartheta - r \sin \vartheta = r(\vartheta - \sin \vartheta)$$

$$y = r - r \cos \vartheta = r(1 - \cos \vartheta)$$

$$V_0 > 0$$

Решение определено и при $V_0 = 0$:

$$\beta = \frac{V_0^2}{2g} = 0 \Rightarrow \vartheta_0 = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = r(\vartheta - \sin \vartheta) \\ y = r(1 - \cos \vartheta) \end{cases}$$

3.11 Минимальная поверхность вращения

$$J(x) := 2\pi \int_{-a}^a x \sqrt{1 + (x')^2} dt \rightarrow \inf$$

$$x(-a) = x(a) = A, \quad x \in C^1[-a, a]$$

$$a, A > 0$$

<-!-РИСУНОК!->

Выбрать кривую так, чтобы площадь поверхности вращения была минимальной.

$J(x)$ — площадь поверхности вращения графика кривой $x(t)$

$$\begin{aligned} F &= F(x, y) = x \sqrt{1 + y^2} \quad U : x > 0 \\ F'_y &= x \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}}, \quad F''_{yy} = \frac{x}{(1 + y^2)^{1/2}} > 0 \text{ на } U \end{aligned}$$

Уравнение Эйлера (с понижением порядка):

$$\begin{aligned} x \sqrt{1 + (x')^2} - x' \frac{xx'}{\sqrt{1 + (x')^2}} &= \lambda \\ x(t) &= \lambda \sqrt{1 + (x')^2}, \quad \lambda > 0 \end{aligned}$$

$x(t) \equiv \lambda$ — побочное решение

Гиперболические функции:

$$\operatorname{ch}(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \quad \operatorname{sh}(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

<-!-РИСУНОК!->

$$\begin{aligned} [\operatorname{ch} t]' &= \operatorname{sh} t, \quad [\operatorname{sh} t]' = \operatorname{ch} t \\ \operatorname{ch}^2(t) - \operatorname{sh}^2(t) &= 1 \end{aligned}$$

$$x'(t) = \operatorname{sh} \xi(t)$$

$$x(t) = \lambda \sqrt{1 + [\operatorname{sh} \xi(t)]^2} = \lambda \operatorname{ch} \xi(t)$$

Дифференцируем по t :

$$\operatorname{sh} \xi(t) = (\lambda \xi') \operatorname{sh} \xi(t)$$

$$\lambda \xi' \equiv 1; \quad \xi' = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \xi = \frac{1}{\lambda}(t + c)$$

$$x(t) = \lambda \operatorname{ch} \frac{t + c}{\lambda}$$

$c = 0$ в силу симметричности краевых условий

$$\lambda : \quad \lambda \operatorname{ch} \frac{a}{\lambda} = A$$

Решение: $x(t) = \lambda \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda}$

Γ_λ — график $x = \lambda \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda}$, Γ_1 — график $x = \operatorname{ch} t$
 $\Rightarrow \Gamma_\lambda = \lambda \Gamma_1$

$$(t, x) \in \Gamma_\lambda \Rightarrow \left(\frac{t}{\lambda}, \frac{x}{\lambda}\right) \in \Gamma_1 \Rightarrow \frac{1}{\lambda}(t, x) \in \Gamma_1 \iff (t, x) \in \lambda \Gamma_1$$

<-!-РИСУНОК!->

$$\operatorname{ch} \frac{a}{\lambda} = \frac{a}{\lambda} \frac{A}{a}$$
$$\vartheta = \frac{a}{\lambda}; \quad \varphi(\vartheta) = \frac{\operatorname{ch} \vartheta}{\vartheta} = \frac{A}{a}$$

$$\varphi'(\vartheta) = \frac{1}{\vartheta^2} [\vartheta \operatorname{sh} \vartheta - \operatorname{ch} \vartheta] = \frac{\operatorname{sh} \vartheta}{\vartheta^2} [\vartheta - \operatorname{cth} \vartheta]$$

$$\left(\operatorname{cth} \vartheta = \frac{e^\vartheta + e^{-\vartheta}}{e^\vartheta - e^{-\vartheta}} = \frac{e^{2\vartheta} + 1}{e^{2\vartheta} - 1} = 1 + \frac{2}{e^{2\vartheta} - 1} \right)$$

<-!-РИСУНОК!->

$$\varphi'(\vartheta_0) = 0 \quad [\operatorname{cth} \vartheta_0 = \vartheta_0]$$
$$\varphi'(\vartheta) < 0 \text{ при } \vartheta < \vartheta_0, \varphi'(\vartheta) > 0 \text{ при } \vartheta > \vartheta_0$$

<-!-РИСУНОК!->

$$\varphi'(\vartheta_0) = \frac{\operatorname{ch} \vartheta_0}{\operatorname{cth} \vartheta_0} = \operatorname{sh} \vartheta_0$$
$$\frac{A}{a} > \operatorname{sh} \vartheta_0 : \vartheta_1 \text{ и } \vartheta_2 \text{ — корни уравнения } \varphi(\vartheta) = \frac{A}{a}, \quad 0 < \vartheta_1 < \vartheta_2$$
$$\lambda_1 = \frac{a}{\vartheta_1}, \quad \lambda_2 = \frac{a}{\vartheta_2}, \quad \lambda_1 > \lambda_2 > 0$$
$$x_1(t) = \lambda_1 \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda_1}, \quad x_2(t) = \lambda_2 \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda_2}$$

<-!-РИСУНОК!->

Можно доказать, что усиленное условие Якоби выполняется на $x_1(t)$ (при большем λ) и не выполняется на $x_2(t)$.

Решение единственno, когда $\frac{A}{a} = \operatorname{sh} \vartheta_0$ (когда точка (a, A) лежит на касательной к гиперболическому косинусу).

[Если точка (a, A) вне конуса, то решение — 2 круга. У нас этого быть не может, т.к. $x > 0$.]

3.12 Изопериметрическая задача

$$\begin{aligned} & \int_a^b F(t, x, x') dt \rightarrow \inf \\ & \int_a^b G(t, x, x') dt = l \\ & x(a) = A, x(b) = B, x \in C^1[a, b] \end{aligned} \tag{3.12.1}$$

Объяснение названия "изопериметрическая задача":
при $A = B = 0$ второй интеграл дает ограничения на длину кривой.

Будем получать необходимые условия оптимальности.
 $F, G \in C^1(U)$, Ω^0 — естественная область задания, $\Omega^0 \neq \emptyset$
 x_0 — решение (3.12.1)

$$\begin{aligned} x(t, \xi) &= x_0(t) + \xi_1 h_1(t) + \xi_2 h_2(t) \\ h_1, h_2 &\in C_0^1[a, b], \quad \xi = (\xi_1, \xi_2) \\ f(\xi) &:= \int_a^b F(t, x(\xi, t), x'(\xi, t)) dt \\ g(\xi) &:= \int_a^b G(t, x(\xi, t), x'(\xi, t)) dt - l \\ f(\xi) &\rightarrow \inf \\ g(\xi) &= 0 \end{aligned} \tag{3.12.2}$$

$\xi = \mathbb{O}$ — решение (3.12.2) [$x(t, \mathbb{O}) = x_0(t)$]
В (3.12.2) h_1, h_2 фиксированы

$$\frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} = \int_a^b [G'_x h_2 + G'_{x'} h'_2] dt$$

Предположим, что

$G'_{x'} \notin C^1[a, b]$
или $G'_{x'} \in C^1[a, b]$, но $G''_x - \frac{d}{dt} G'_x \neq 0$ на $[a, b]$
В этом случае $\exists h_2 \in C_0^1[a, b] : \frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} \neq 0$

\tilde{h}_2 фиксирована навсегда

Аргумент $G'_x, G'_{x'}$ есть (t, x_0, x'_0)

$h_1 \in C_0^1[a, b]$ фиксирована

По теореме Куна-Таккера (точнее говоря, Лагранжа)

$$\exists u \in \mathbb{R} : f'(\mathbb{O}) = ug'(\mathbb{O})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\mathbb{O})}{\partial \xi_1} &= u \frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_1} \\ \frac{\partial f(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} &= u \frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} \Rightarrow u = \left(\frac{\partial f(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} \right) \Big/ \left(\frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_2} \right) \end{aligned}$$

u не зависит от h_1 !

$$0 = \frac{\partial f(\mathbb{O})}{\partial \xi_1} - u \frac{\partial g(\mathbb{O})}{\partial \xi_1} = \int_a^b [(F'_x - uG'_x)h_1 + (F'_{x'} - uG'_{x'})h'_1] dt$$

$$L = F - uG$$

$$\int_a^b [L'_x h_1 + L'_{x'} h'_1] dt = 0 \quad \forall h_1 \in C_0^1[a, b]$$

По основной лемме вариационного исчисления (лемма 3.1.3)

$$L'_{x'} \in C^1[a, b] \text{ и } L'_x - \frac{d}{dt} L'_{x'} = 0 \text{ на } [a, b] \quad (3.12.3)$$

К этому нужно добавить

$$\int_a^b G(t, x, x') dt = l, \quad x(a) = A, \quad x(b) = B$$

Пример 3.12.1 Цепная линия

Тяжелая однородная цепь длины $l > 2a$ подвешена в точках $(-a, A)$ и (a, A) .

Описать положение цепи.

Решение.

$$x_* = \frac{p_1 x_1 + \dots + p_n x_n}{p_1 + \dots + p_n}$$

p_i — вес i -го элемента (разбили цепь на маленькие части)

Предположим, что вес нити равен 1 ($\sum p_i = 1$).

$$p_i = \frac{1}{l} ds_i$$

Формула для центра тяжести:

$$\frac{1}{l} \int_{-a}^a x ds = \frac{1}{l} \int_{-a}^a x \sqrt{1 + (x')^2} dt$$

$$\int_{-a}^a x \sqrt{1 + (x')^2} dt \rightarrow \inf$$

$$\int_{-a}^a \sqrt{1 + (x')^2} dt = l$$

$$x(-a) = x(a) = A$$

$$L = x \sqrt{1 + (x')^2} - u \sqrt{1 + (x')^2} = \sqrt{1 + (x')^2}(x - u)$$

Поскольку L не зависит от t , уравнение Эйлера выглядит как

$$L - x' L'_{x'} := (x - u) \sqrt{1 + (x')^2} - x'(x - u) \frac{x'}{\sqrt{1 + (x')^2}} \equiv \lambda \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x - u = \lambda \sqrt{1 + (x')^2}$$

$$\begin{aligned} x' &= \operatorname{sh} \xi(t) \\ x - u &= \lambda \operatorname{ch} \xi(t) \end{aligned}$$

Дифференцируем по t : $\operatorname{sh} \xi(t) = \lambda \xi' \operatorname{sh} \xi(t) \Rightarrow \lambda \xi' = 1 \Rightarrow \xi = \frac{t-c}{\lambda}$

$x = u + \lambda \operatorname{ch} \frac{t-c}{\lambda}$

$c - 0$ в силу симметричности краевых условий

$x = u + \lambda \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda}$

$$\begin{aligned} l &= \int_{-a}^a \sqrt{1 + (x')^2} dt = \int_{-a}^a \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 \frac{t}{\lambda}} dt = 2 \int_0^a \operatorname{ch} \frac{t}{\lambda} dt = \\ &= 2\lambda \operatorname{sh} \frac{t}{\lambda} \Big|_0^a = 2\lambda \operatorname{sh} \frac{a}{\lambda} \\ 2a \frac{\lambda}{a} \operatorname{sh} \frac{a}{\lambda} &= l \Rightarrow \frac{\operatorname{sh} \vartheta}{\vartheta} = \frac{l}{2a} > 1 \quad (\vartheta = \frac{a}{\lambda}) \end{aligned}$$

$\frac{\operatorname{sh} \vartheta}{\vartheta} = 1 + \frac{\vartheta^2}{3} + \frac{\vartheta^4}{5} + \dots$ строго возрастает от 1 до ∞

ϑ_0 — единственный корень уравнения $\frac{\operatorname{sh} \vartheta}{\vartheta} = \frac{l}{2a}$

$\lambda_0 = \frac{a}{\vartheta_0}$

$u_0 = A - \lambda_0 \operatorname{ch} \frac{a}{\lambda_0}$ (подставили $t = a$)

$\operatorname{ch}(t)$ — цепная линия